



Ospedale Maria Vittoria – PRONTO SOCCORSO

SCHEDA DI TRIAGE

PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI PATOLOGIE TRASMISSIBILI PER VIA AEREA

Cognome _____ Nome _____ Data nascita _____ data _____ ora _____
Luogo _____

RISCHIO TB

Segni e sintomi

- Tosse da più di due settimane Emoftoe Febbre o febbrecola Dimagrimento

Fattori di rischio

- HIV TD Alcoolista Pregressa TB Immigrato Senza fissa dimora Carcerato
 Patologie associate (diabete, immunocompromissione, cirrosi scompensata) Precedente ricovero in reparto lungodegenti

Accertamenti radiologici

- Esito RX Torace per TB: POSITIVO SOSPETTO NEGATIVO

Valutazione

- l'utente riferisce **oltre la tosse** almeno uno dei segni/sintomi indicati e/o la radiografia del torace risulta positiva o sospetta per TB → ³ADOTTARE MISURE DI ISOLAMENTO PER PATOLOGIE TRASMISSIBILI PER VIA AEREA

RISCHIO SARS

Segni e sintomi

- Febbre elevata > 38°C Tosse Respiro breve e affannoso

Fattori di rischio

- Provenienza, **nei 10 giorni antecedenti la comparsa dei sintomi**, da aree quali Cina, Taiwan, Vietnam, Hong Kong, Singapore, Canada (zona di Toronto), Filippine (zona di Manila)¹
 Contatto stretto², **nei 10 giorni antecedenti la comparsa dei sintomi**, con persone malate provenienti recentemente da aree quali Cina, Taiwan, Vietnam, Hong Kong, Singapore, Canada (zona di Toronto), Filippine (zona di Manila)¹
 Personale sanitario con recente storia di assistenza diretta a pazienti affetti da polmonite

Accertamenti radiologici

- Esito RX Torace per SARS: SOSPETTO NEGATIVO

Valutazione

- l'utente riferisce presenza **contemporanea** di almeno 1 dei criteri epidemiologici e almeno 1 dei segni/sintomi indicati → ⁴ADOTTARE MISURE DI ISOLAMENTO PER PATOLOGIE TRASMISSIBILI PER VIA AEREA E DA CONTATTO

Firma dell'infermiere _____

LEGENDA

TB : tubercolosi

TD: tossicodipendente

NOTE

¹ i criteri epidemiologici non sono più considerati nella definizione di caso dei CDC. A scopo preventivo, per il triage del paziente a rischio, vengono prese in considerazione le aree ad alto rischio di recrudescenza dell'infezione e le aree in cui si sono verificati dei casi secondari

² **CONTATTO STRETTO**: colui che si è preso cura, ha vissuto o ha avuto probabilità di contatto diretto con secrezioni respiratorie e/o fluidi corporei di definito caso di SARS. Esempi di contatto: baciare, abbracciare, condividere stoviglie, conversazione a distanza , conversazione a distanza ravvicinata (75 – 100 cm), visita medica. Contatto stretto **NON** comprende camminare vicino ad una persona sospetta, sostare per breve tempo in una ufficio o in una sala di attesa insieme a persone contagiate

^{3 e 4} MISURE DI ISOLAMENTO

PRECAUZIONI IMMEDIATE

1. L'operatore deve indossare immediatamente il filtrante **FFP2S**
2. Fare indossare al paziente una **mascherina chirurgica**
3. Condurre il paziente nella **stanza di isolamento** (se occupata, allontanare il paziente dal resto dell'utenza per il tempo necessario per allestire la camera)
4. Avvisare il **medico**

ASSISTENZA PRESSO LA CAMERA DI ISOLAMENTO

³**TB** = ADOTTARE MISURE DI ISOLAMENTO PER PATOLOGIE TRASMISSIBILI PER VIA AEREA (Consultare protocollo aziendale "Misure di isolamento in ospedale")

⁴**SARS** = ADOTTARE MISURE DI ISOLAMENTO PER PATOLOGIE TRASMISSIBILI PER VIA AEREA E DA CONTATTO (Consultare protocollo "gestione paziente SARS")