	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel.011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3	Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale	PAG. 1 P.T. 01/07 REV. 01
--	---	---	--

<u>TIPO DI DOCUMENTO</u>	Procedura tecnica
---------------------------------	-------------------

<u>ELABORAZIONE</u>	Dott. ^{ssa} Mazengo M., Dott. ^{ssa} Cinnirella G., Dott. ^{ssa} Giacomotti M, CPSE - ICI Fanton C., con la collaborazione delle UU.OO ASL 3	Data: 20/04/2007
----------------------------	--	-------------------------

INDICE

Indice analitico	pag. 2
Indice analitico schede antisettici e disinfettanti	pag. 2
PREMESSA	pag. 5
1. Introduzione	pag. 6
2. Scopo	pag. 6
3. Campo di applicazione	pag. 6
4. Terminologia, abbreviazioni, simboli	pag. 7
5. Responsabilità	pag. 8
6. Descrizione delle attività	pag. 9
7. Riferimenti bibliografici	pag. 11
8. Registrazione ed archiviazione	pag. 11
9. Allegati	pag. 12
ALLEGATO N. 1 Schede singole per materiale/manovra	pag. 13 - 89
ALLEGATO N. 2 Prospetto riassuntivo diluizione stabilità dei prodotti	pag. 90
ALLEGATO N. 3 Schede delle molecole disinfettanti/antisettiche	pag. 94
ALLEGATO N. 4 Suddivisione dell'ospedale in aree a diverso grado di rischio	pag. 110
ALLEGATO N. 5 Tipologie di Rifiuti sanitari	pag. 113
ALLEGATO N. 6 Scheda di autovalutazione	pag. 114

<u>APPROVAZIONE</u>	Referente UOa PRI	Dott. A. Macor	<i>(Firmato in originale)</i>	Data 20/04/2007
	CIO	Dott. A. Macor	<i>(Firmato in originale)</i>	
	Direttore Farmacia	Dott. ^{ssa} M. Mazengo	<i>(Firmato in originale)</i>	
	D.S. OMV	Dott. ^{ssa} M.T. Sensale	<i>(Firmato in originale)</i>	
	D.S. OAS/OBV	Dott. P. Mussano	<i>(Firmato in originale)</i>	
	Direttore U.O.a.		<i>Firma</i>	
	Coordinatore U.O.a.		<i>Firma</i>	

<u>DIFFUSIONE</u>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Reparti e servizi, distretti ASL 3</i> 	Data: _____
--------------------------	---	-------------

<u>VERIFICA</u> <u>APPLICAZIONE</u>	RESPONSABILITA' Direttore U.O. Caposala U.O	FREQUENZA Quadrimestrale
--	--	------------------------------------

<u>REVISIONE</u> Triennale	Rev. n°	Data	Descrizione modifiche	A cura di

<p style="text-align: center;">SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3</p>	<p style="text-align: center;">Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale</p>	<p style="text-align: center;">Pag. 2 P.T. 01/07 REV. 01</p>
--	--	---

Per una **consultazione rapida** del manuale on line:

- 1) individuare nell'indice analitico e/o nelle schede tecniche il numero di pagina desiderato
- 2) posizionare il cursore nella finestrella visibile in basso sul monitor dove è indicato il numero di pagina corrente
- 3) digitare il numero di pagina desiderato e premere invio; con la freccia verde si torna alla pagina precedente
- 4) per stampare soltanto la scheda desiderata: selezionare stampa > pagina corrente

INDICE ANALITICO

▪ Abrasioni – Escoriazioni -----	Pag. 13
▪ Ambu -----	Pag. 14
▪ Ampolla per aerosol terapia -----	Pag. 49
▪ Antisepsi del cavo orale -----	Pag. 34
▪ Antisepsi del meato urinario -----	Pag. 32
▪ Apparecchiature elettromedicali -----	Pag. 16
▪ Apparecchio del Catani -----	Pag. 15
▪ Arbarelle (lavaggio manuale in assenza di lavapadelle) -----	Pag. 57
▪ Arcelle -----	Pag. 17
▪ Archetto sollevacoperte -----	Pag. 20
▪ Arredi (comodini, mobili, letti, sedie e suppellettili varie) escluse le incubatrici -----	Pag. 18
▪ Aspiratori portatili -----	Pag. 16
▪ Aspiratori riutilizzabili -----	Pag. 19
▪ Aste sollevamalati -----	Pag. 20
▪ Aste sostegno per fleboclisi -----	Pag. 20
▪ Attrezzature non invasive riutilizzabili -----	Pag. 20
▪ Attrezzature per il trasporto dell'assistito -----	Pag. 21
▪ Auricolari riutilizzabili per otoscopi -----	Pag. 22
▪ Ausili per la deambulazione -----	Pag. 20
▪ Bacinelle reniformi -----	Pag. 17
▪ Barelle -----	Pag. 21
▪ Biberon -----	Pag. 23
▪ Biopsia, preparazione della cute -----	Pag. 38
▪ Boccaglio per aerosol terapia -----	Pag. 49
▪ Borse acqua calda -----	Pag. 20
▪ Borse ghiaccio -----	Pag. 20
▪ Broncoscopi, disinfezione manuale e/o automatizzata -----	Pag. 71
▪ Campo operatorio -----	Pag. 24
▪ Cannule orofaringee (di Mayo) -----	Pag. 25
▪ Capezzoli "detersione nell'allattamento" -----	Pag. 26
▪ Cappe a flusso laminare verticale -----	Pag. 28
▪ Cappe di Classe II rischio biologico-----	Pag. 27
▪ Carrelli ed attrezzature per il trasporto dei materiali, degli alimenti, della terapia -----	Pag. 29
▪ Carrozze -----	Pag. 21
▪ Catani (irrigatore) -----	Pag. 15
▪ Cateterismo venoso centrale -----	Pag. 30
▪ Cateterismo venoso periferico -----	Pag. 31
▪ Cateterismo vescicale (antisepsi del meato) -----	Pag. 32
▪ Cateterismo vescicale (tecnica) -----	Pag. 33
▪ Cavo orale (antisepsi) -----	Pag. 34
▪ Colonscopi, disinfezione manuale e/o automatizzata -----	Pag. 71
▪ Comoda -----	Pag. 57
▪ Comodini -----	Pag. 18

<p style="text-align: center;">SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3</p>	<p>Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale</p>	<p>Pag. 3 P.T. 01/07 REV. 01</p>
---	--	---

▪ Contenitore riutilizzabile per il trasporto di campioni biologici -----	Pag. 29
▪ Contenitori pluriuso (per tettarelle, per ampole aerosol, ecc.) -----	Pag. 35
▪ Cordone ombelicale -----	Pag. 36
▪ Cute integra, preparazione al posizionamento di Cateteri venosi centrali e periferici, arteriosi e venosi -----	Pag. 40
▪ Cute integra, preparazione all'intervento chirurgico -----	Pag. 37
▪ Cute integra, preparazione alla biopsia -----	Pag. 38
▪ Cute integra, preparazione alla puntura intramuscolo, endovenosa, endoarteriosa -----	Pag. 39
▪ Decontaminazione oggetti e superfici -----	Pag. 41
▪ Dispenser riutilizzabili -----	Pag. 35
▪ Docce per terapia infusione -----	Pag. 20
▪ Endoarteriosa puntura, preparazione della cute -----	Pag. 40
▪ Endoscopi, disinfezione manuale e/o automatizzata -----	Pag. 71
▪ Endovenosa puntura, preparazione della cute -----	Pag. 39
▪ Escoriazioni-----	Pag. 13
▪ Ferite chirurgiche non traumatica -----	Pag. 42
▪ Ferite chirurgiche traumatica-----	Pag. 43
▪ Flussimetri per ossigenoterapia ed aria compressa -----	Pag. 45
▪ Fonendoscopio -----	Pag. 20
▪ Frangiflussi -----	Pag. 44
▪ Frangigetto -----	Pag. 44
▪ Gastroscoopi, disinfezione manuale e/o automatizzata -----	Pag. 71
▪ Girelli -----	Pag. 20
▪ Gorgogliatori per ossigenoterapia -----	Pag. 46
▪ Igiene dei genitali delle pazienti, durante il parto -----	Pag. 47
▪ Incubatrici -----	Pag. 48
▪ Intervento chirurgico, preparazione della cute-----	Pag. 37
▪ Kit per aerosol terapia-----	Pag. 49
▪ Laccio emostatico -----	Pag. 20
▪ Lame laringoscopio -----	Pag. 50
▪ Laringoscopio -----	Pag. 51
▪ Lavaggio antisettico delle mani -----	Pag. 52
▪ Lavaggio chirurgico delle mani -----	Pag. 53
▪ Lavaggio semplice delle mani-----	Pag. 54
▪ Letti -----	Pag. 18
▪ Lesioni da pressione -----	pag. 62
▪ Manometri per vuoto -----	Pag. 45
▪ Martelletto -----	Pag. 20
▪ Maschere per pallone AMBU -----	Pag. 55
▪ Mascherina per aerosol terapia -----	Pag. 49
▪ Materassini antidecubito -----	Pag. 20
▪ Mobili -----	Pag. 18
▪ Moncone ombelicale -----	Pag. 56
▪ Nutripompa -----	Pag. 16
▪ Otoscopio-----	Pag. 51
▪ Padelle e pappagalli, vasini, arbarelle (lavaggio manuale in assenza di lavapadelle) -----	Pag. 57
▪ Pallone AMBU -----	Pag. 14
▪ Pappagalli (lavaggio manuale in assenza di lavapadelle) -----	Pag. 57
▪ PEG: Gestione -----	Pag. 58

<p style="text-align: center;">SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3</p>	<p>Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale</p>	<p>Pag. 4 P.T. 01/07 REV. 01</p>
---	--	---

▪ Perineo, antisepsi -----	Pag. 59
▪ Perineo, detersione -----	pag. 60
▪ Piaghe da decubito -----	Pag. 62
▪ Pompe peristaltiche -----	Pag. 16
▪ Prelievi endovenosi, endoarteriosi, preparazione della cute -----	Pag. 40
▪ Preparazione paziente chirurgico -----	Pag. 61
▪ Punti d'iniezione su gommini -----	Pag. 63
▪ Puntura intramuscolo, preparazione della cute -----	Pag. 39
▪ Punture esplorative, preparazione della cute -----	Pag. 38
▪ Raccordi – Tappi di gomma – Punti d'iniezione su gommini -----	Pag. 63
▪ Sala settoria, superfici -----	Pag. 76
▪ Saturimetri -----	Pag. 16
▪ Scovolini -----	Pag. 35
▪ Sedia comoda -----	pag. 57
▪ Sedie -----	Pag. 18
▪ Sfigmomanometro -----	Pag. 20
▪ Soffioni doccia -----	Pag. 44
▪ Sonde ecografiche lineari e vaginali-----	Pag. 65
▪ Spazzolini -----	Pag. 35
▪ Stampelle -----	Pag. 20
▪ Stomie, detersione della cute peristomale-----	Pag. 66
▪ Strumenti chirurgici (Decontaminazione), lavaggio manuale -----	Pag. 67
▪ Strumenti chirurgici utilizzati su paziente affetto da sospetta CJ - decontaminazione -----	Pag. 70
▪ Strumenti chirurgici, decontaminazione lavaggio automatizzato -----	Pag. 68
▪ Strumenti endoscopici, disinfezione manuale e/o automatizzata -----	Pag. 71
▪ Strumenti per il riscontro autoptico -----	Pag. 69
▪ Succhiotti -----	Pag. 23
▪ Superfici dei locali ad alto rischio -----	Pag. 74
▪ Superfici dei locali a medio rischio -----	Pag. 79
▪ Superfici dei locali ad alto rischio, SALA SETTORIA -----	Pag. 76
▪ Superfici dei locali ad alto rischio, SALA SETTORIA dopo autopsia su paziente affetto da CJ-----	Pag. 77
▪ Superfici dei locali basso rischio -----	Pag. 81
▪ Supporti per terapia infusioneale -----	Pag. 20
▪ Tappi di gomma – Punti d'iniezione su gommini -----	Pag. 63
▪ Termometri a mercurio -----	Pag. 82
▪ Termometro timpanico -----	Pag. 83
▪ Tettarelle -----	Pag. 23
▪ Tonometri e lenti -----	pag. 84
▪ Tripodi -----	pag. 20
▪ Umidificatore per ambiente -----	pag. 85
▪ Vasca per il parto -----	pag. 86
▪ Vasini (lavaggio manuale in assenza di lavapadelle) -----	pag. 57
▪ Vassoi -----	pag. 87
▪ Versamento accidentale di materiale biologico -----	pag. 88
▪ Visiere -----	pag. 89
▪ Visor -----	pag. 89

<p style="text-align: center;"> SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3 </p>	Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale	Pag. 5 P.T. 01/07 REV. 01
---	---	---------------------------------

SCHEDE TECNICHE

Acqua ossigenata-----	Pag. 94
Amuchina -----	Pag. 104
Antisapril -----	Pag. 105
Baxidin Concentrato concentrato -----	Pag. 97
Betadine soluzione -----	Pag. 102
Bionil cpr -----	Pag. 107
Bionil granuli -----	Pag. 107
Braunoderm spray -----	Pag. 101
Cidex -----	Pag. 100
Clorexidina alcolica -----	Pag. 99
Clorexidina gluconato 0,015 + cetrimide-----	Pag. 98
Clorexidina gluconato con cetrimide -----	Pag. 97
Clorexidina gluconato non saponosa -----	Pag. 96
Clorexidina gluconato saponosa -----	Pag. 95
Clorexin Tintura -----	pag. 99
Clorossidante elettrolitico -----	Pag. 105
Dicloroisocianurato -----	Pag. 107
Detergente enzimatico-----	Pag. 109
FARVICETT -----	Pag. 98
Fenplus HWP -----	Pag. 108
Gluteraldeide -----	Pag. 100
Hibiscrub -----	Pag. 95
Iodopovidone in soluzione acquosa -----	Pag. 102
Iodopovidone in soluzione alcolica 10%-----	Pag. 101
Iodopovidone in soluzione idroalcolica -----	Pag. 103
Milton -----	Pag. 106
Neoxinal -----	Pag. 96
Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) -----	Pag. 94
Polifenoli -----	Pag. 108
Povi Iodine Scrub 10%-----	Pag. 103
Proteozim PLUS -----	Pag. 109



PREMESSA

Il lavoro qui di seguito presentato è la sintesi e revisione di:

- 1)** Linee guida alla pulizia, sanificazione, disinfezione (presidio ospedaliero OMV, 1998)
- 2)** Guida all'impiego delle soluzioni antisettiche e disinfettanti (ASL 3, 2000)
- 3)** Protocolli e procedure elaborate (ASL 3, periodo 1998 - 2004)

E' stato impostato con il preciso scopo di creare uno strumento di facile consultazione da parte di tutti gli operatori sanitari. Per questo motivo, dopo una parte generale, la procedura ne prevede una specifica articolata in singole schede riferite ad ambienti, oggetti e superfici soggette ad interventi di disinfezione.

La stesura del documento, nella forma come nei contenuti, ha comportato un notevole lavoro di revisione e sintesi di quanto presente sia in azienda sia in letteratura.

Ci auguriamo che lo sforzo di quanti hanno collaborato venga ricompensato da un utilizzo puntuale e ragionato della procedura.

<p style="text-align: center;"> SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3 </p>	<p style="text-align: center;"> Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale </p>	<p style="text-align: center;"> Pag. 6 P.T. 01/07 REV. 01 </p>
---	--	---

1. Introduzione

La trasmissione della patologia infettiva in ospedale vede coinvolti fattori inerenti l'**ospite** (grado di suscettibilità individuale), l'**agente** (selezione di nuovi ceppi e di ceppi antibiotico resistenti), l'**ambiente** ed i **comportamenti** del personale sanitario.

Nonostante numerosi interventi siano realizzati per migliorare le condizioni dell'ospite ed inattivare l'agente, gli sforzi maggiori per spezzare la catena di trasmissione dell'infezione (agente – ambiente – ospite) devono essere diretti ai comportamenti.

La letteratura scientifica in tema fornisce indicazioni di comportamento - "**misure di controllo**" e "**raccomandazioni**" - il cui obiettivo è limitare la possibilità di trasmissione dei microrganismi.

Questo può attuarsi attraverso:

- soppressione dei rischi legati alla strumentazione riutilizzabile
- riduzione della trasmissione interumana
- limitazione della contaminazione da parte dell'ambiente inanimato (acqua, aria, alimenti, superfici, rifiuti ospedalieri).

Il raggiungimento di questi obiettivi in modo quanto più semplice e chiaro è alla base di questa procedura e di come è stata elaborata.

2. Scopo

Definire le manovre da eseguire, per il controllo del rischio infettivo in ospedale, per ricondizionare oggetti riutilizzabili (articoli critici, semicritici e non critici), ambiente e superfici (aree ad alto medio e basso rischio).

Il presente manuale è articolato in singole schede, raccolte in ordine alfabetico e riferite all'oggetto della procedura; per esempio, per l'antisepsi della cute integra ⇨ fare riferimento a cute integra.

Ogni scheda contiene:

- *Titolo dell'oggetto della procedura*
- *Decontaminante*
- *Tempo di contatto*
- *Detergente*
- *Disinfettante/Antisettico*
- *Tempo di contatto*
- *Modalità d'intervento: Decontaminazione, Sanificazione, Disinfezione, Asciugatura, Conservazione*
- *Norme di sicurezza*
- *Smaltimento*
- *Note*

Sono inoltre presenti:

- tabella riassuntiva (allegato 2) in cui, partendo dal nome commerciale del prodotto disinfettante e/o antisettico, si identificano i campi d'utilizzo dello stesso
- singole schede delle molecole antisettiche/disinfettanti (allegato 3)
- schemi riassuntivi delle aree ospedaliere ad alto, medio e basso rischio (allegato 4)

3. Campo d'applicazione

Oggetti, superfici, ambienti dell'ASL 3

<p style="text-align: center;"> SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3 </p>	<p style="text-align: center;"> Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale </p>	<p style="text-align: center;"> Pag. 7 P.T. 01/07 REV. 01 </p>
---	--	---

4. Terminologia, abbreviazioni, simboli

ANTI SEPSI: processo che distrugge o inibisce la moltiplicazione dei microrganismi su tessuti viventi.

ANTISETTICO: sostanza chimica che previene o arresta la crescita o l'azione dei microrganismi attraverso l'inibizione o distruzione degli stessi. Il termine è usato per preparazioni da applicare su organismi viventi; il prodotto ad attività antimicrobica aspecifica è caratterizzato da bassa tossicità.

BATTERICIDA: agente chimico o fisico che uccide i batteri.

BATTERIOSTATICO: sostanza chimica che previene lo sviluppo dei batteri inibendone la moltiplicazione, ma senza ucciderli.

BIOCIDA: sostanza che uccide gli organismi viventi patogeni e non patogeni.

CLINICAL BOX: contenitore deputato al trasporto dei RSP-I costituito da un contenitore interno a sacco in PVC, impermeabile e con chiusura a laccio e da un involucro esterno in cartone rigido con stampigliata la dicitura **"Rifiuti Sanitari Pericolosi a rischio Infettivo"** + simbolo di rischio biologico

DECONTAMINAZIONE: processo in grado di liberare un oggetto dalla presenza occasionale, transitoria ed inconsueta di microrganismi (contaminazione). **La decontaminazione avviene esponendo all'azione di agenti disinfettanti articoli NON precedentemente detersi.** In tale situazione non è possibile prevedere quale sarà la riduzione della carica microbica ottenuta, per questo motivo il materiale decontaminato deve essere trattato con le stesse precauzioni che s'impiegano per il materiale infetto.

Il processo di decontaminazione ha assunto un significato specifico dopo l'emanazione del Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990, che, all'Art. 2 indica che: *"I presidi riutilizzabili debbono, dopo l'uso, essere immediatamente immersi in un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull'HIV prima delle operazioni di smontaggio o pulizia, da effettuare come preparazione alla sterilizzazione"* si deduce quindi come il processo di decontaminazione assuma una valenza d'obbligatorietà nei confronti d'ogni articolo contaminato. Disinfettanti attivi nel processo di Decontaminazione

- ipoclorito di sodio 0,5% (*CANDEGGINA*)
- dicloroisocianurato di sodio 0,5% (*BIONIL*)
- soluzioni polifenoliche (*FENPLUS*)

DETERGENTE: sostanza naturale o sintetica in grado di ridurre la tensione superficiale tra lo sporco e la superficie da pulire favorendone l'asportazione

DISINFETTANTE: sostanza chimica ad attività antimicrobica aspecifica destinato all'impiego su oggetti e superfici e sull'uomo.

DISINFEZIONE: processo che elimina i microrganismi patogeni presenti sul materiale trattato, con la sola eccezione delle spore batteriche. Si può classificare in:

DISINFEZIONE AD ALTO LIVELLO: processo che determina inattivazione di tutti i microrganismi presenti, compreso HIV, HBV, Micobatterio tubercolare, con la sola eccezione delle spore batteriche. I prodotti che garantiscono una disinfezione ad alto livello sono:

- ✓ sodio ipoclorito 0,5-1%, per un tempo di contatto superiore a 30 minuti
- ✓ glutaraldeide al 2%, per un tempo di contatto superiore ai 30 minuti
- ✓ iodofori 0,05-0,5 % di iodio disponibile, per un tempo di contatto superiore a 30 minuti.

DISINFEZIONE A LIVELLO INTERMEDIO: intervento antimicrobico ad ampio spettro indicato in assenza di spore, HIV, HBV e bacillo tubercolare. I prodotti che garantiscono una disinfezione a livello intermedio sono:

- ✓ sodio ipoclorito 0,1 - 0,5% per un tempo di contatto di 10-20 minuti
- ✓ alcool etilico denaturato a 70°, per un tempo di contatto di 10-20 minuti
- ✓ iodofori 0,05% di iodio disponibile per un tempo di contatto di 10-20 minuti
- ✓ glutaraldeide 2%, per 10-20 minuti.

DISINFEZIONE A BASSO LIVELLO: intervento inteso ad eliminare i batteri in forma vegetativa, con particolare riferimento a *Stafilococco aureo* e *Pseudomonas aeruginosa*. I prodotti indicati sono:

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3	Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale	Pag. 8 P.T. 01/07 REV. 01
---	---	--

- ✓ soluzioni fenoliche o iodofore detergenti
- ✓ sodio ipoclorito 0,1%
- ✓ alcool etilico denaturato a 70°

DPI: Dispositivo di Protezione Individuale. E' tale qualsiasi dispositivo, indossato dal lavoratore durante la propria prestazione d'opera, atto a proteggerlo dall'esposizione a rischi lavorativi (biologici, chimici, fisici, ecc.).

FUNGICIDA: sostanza chimica che uccide i miceti sia su tessuti viventi sia su oggetti inanimati.

GERMICIDA: sostanza chimica che distrugge tutti i microrganismi in fase vegetativa (batteri, virus, miceti)

MICOSTATICO: sostanza chimica che previene lo sviluppo dei miceti senza ucciderli.

NaOH: Idrossido di Sodio in soluzione a diversa concentrazione d'uso (es. **1N** o **2N**). Richiedere al servizio di Farmacia (preparazione galenica)

PPM: unità di misura utilizzata per indicare livelli estremamente bassi di concentrazione di un elemento chimico o di una qualsiasi sostanza. Il valore del ppm è equivalente alla quantità assoluta frazionale moltiplicata per un milione (= 10⁶)

PULIZIA: rimozione meccanica dello sporco da superfici, oggetti, cute e mucose, effettuata utilizzando acqua con/senza detergente.

SANIFICAZIONE procedura atta a ridurre la carica microbica su oggetti e superfici nei limiti di "sicurezza" dettati dalle norme igieniche avvalendosi dell'uso dei detergenti.

SANITIZZAZIONE: procedura atta a ridurre la carica microbica e mantenere per un tempo relativo il livello di "sicurezza" fissato dalle normative d'igiene, avvalendosi dell'uso di disinfettanti su oggetti e superfici.

STERILIZZAZIONE: processo fisico/chimico che comporta l'eliminazione di tutti i microrganismi, comprese le spore batteriche. I principali agenti sterilizzanti usati sono vapore sotto pressione (autoclave), processi di sterilizzazione a bassa temperatura (ossido d'etilene sterilizzazione a gas plasma, sterilizzazione con acido peracetico).

RSP - I: Rifiuti Sanitari Pericolosi a rischio Infettivo

VIRUCIDA: sostanza chimica che uccide o inattiva i virus.

VIRUSTATICO: sostanza chimica che previene lo sviluppo dei virus senza ucciderli.

UOa PRI: Unità Operativa Prevenzione Rischio Infettivo

5. Responsabilità

L'adozione delle misure descritte nel presente documento deve avvenire in maniera sistematica da parte di tutto il personale sanitario infermieristico, medico e di supporto all'assistenza, nel rispetto delle specifiche competenze professionali ed in relazione alle singole attività dettagliate nel documento.

Il Direttore ed il Coordinatore Infermieristico dell'UOa verificano puntualmente l'adozione delle misure di seguito riportate e ne sono personalmente responsabili. In dettaglio:

ATTIVITA'	Direttore			Direttori UU.OO	Dirigenti medici	Caposala Coordinatori	Operatori Sanitari	Personale di supporto
	Sanitario	Farmacia	PRI					
Stesura della procedura	C	R	C			C	C	C
Applicazione procedura	R	R	R	R	R	R	R	C
Revisione Procedura	C	R	C	C	C	C	C	C
Informazione/formazione	R	R	R					

Legenda : R= responsabile C= coinvolto

6. Descrizione delle attività

6.1 Raccomandazioni

Le raccomandazioni a seguito riportate sono riferite ad **ambiente**, **prodotti** ed **oggetti** da trattare e **prodotti** da smaltire.

6.1.1 Raccomandazioni per l'ambiente

Gli interventi di pulizia, sanificazione e disinfezione dell'ambiente ospedaliero sono individuati in relazione alle caratteristiche igieniche delle aree da pulire. La struttura ospedaliera è convenzionalmente suddivisa in tre zone, in rapporto al rischio infettivo (**tab. 1**)

tab. 1 – Aree a rischio infettivo in ospedale.

<u>AREE AD ALTO RISCHIO</u>	<u>AREE A MEDIO RISCHIO</u>	<u>AREE A BASSO RISCHIO</u>
Camere operatorie	Locali di degenza	Locali amministrativi
Terapia intensiva	Ambulatori	Locali ad uso didattico
Aree che ospitano soggetti immunocompromessi	Laboratori	Aree di passaggio comuni
Aree che ospitano soggetti affetti da patologie infettive	Sale endoscopiche	
	Pronto soccorso	

Identificata una metodologia d'intervento, la differenza sostanziale nell'attuazione dei processi di sanificazione e di disinfezione delle tre aree è determinata dalla frequenza degli interventi.

Nelle aree ad alto rischio è sufficiente eseguire una disinfezione ambientale di livello intermedio, nelle aree a medio rischio una disinfezione di basso livello mentre in quelle a basso rischio una disinfezione periodica e saltuaria.

E' ormai dimostrato che la riduzione della carica batterica ambientale si ottiene principalmente con adeguate procedure di pulizia; pertanto, la disinfezione ambientale deve essere effettuata solo quando ritenuta necessaria. Inoltre:

- Far precedere **sempre** operazioni di pulizia alla disinfezione ambientale
- Adottare **sistemi ad umido** per la rimozione della polvere e per la spazzatura degli ambienti, in quanto i sistemi a secco comportano la dispersione aerea di pulviscolo ambientale
- E' consigliato l'uso di materiale a perdere (monouso) per le operazioni di pulizia e disinfezione. Il materiale riutilizzabile, come le scope a frange o il fiocco lavapavimenti, deve essere **decontaminato e pulito dopo l'utilizzo**; un fiocco lavapavimenti sporco, umido, conservato in un locale poco aerato, durante l'uso può disseminare nell'ambiente più germi di quanti ne dovrebbe raccogliere.
- L'uso di materiale poroso per effettuare le operazioni di pulizia (es. spugne) è vivamente sconsigliato, in quanto è considerato un terreno favorevole per la proliferazione microbica.
- Iniziare sempre le operazioni di pulizia dalle aree meno sporche verso quelle più contaminate.
- Non risciacquare le superfici ambientali trattate con disinfettante per consentire l'azione residua della soluzione.

6.1.2 Raccomandazioni per una corretta gestione dei prodotti per la sanificazione e la disinfezione

- Nessun disinfettante può essere efficace se è impiegato su materiale inorganico (arredi, strumenti, ecc.) od organico (cute) **non pulito precedentemente**
- La sporcizia protegge i microbi impedendo al disinfettante di raggiungerli e di esplicare la sua azione; inoltre, può costituire un ottimo terreno per la loro proliferazione. Occorre far precedere alla disinfezione un accurato lavaggio
- Non esiste un disinfettante valido per tutti gli usi; per questo motivo i disinfettanti prescelti sono più di uno e sono il risultato di un compromesso tra le diverse esigenze
- Il disinfettante ideale dovrebbe possedere: ampio spettro d'azione, elevato potere di penetrazione ed assenza di tossicità, non deve essere irritante per i tessuti e non deve indurre sensibilizzazione, deve essere capace anche di agire in presenza di materiale organico, deve essere innocuo verso il materiale da trattare, di facile applicazione e con rapida azione mantenuta per lungo tempo; deve essere economico
- Deve essere prestata la massima attenzione alle **istruzioni d'impiego** delle soluzioni disinfettanti (diluizione, tempo di contatto, avvertenze, ecc.) per usarlo nelle migliori condizioni affinché espliciti la propria efficacia

- Bagnare direttamente i panni per la pulizia/disinfezione evitando di spruzzare direttamente su superfici ed oggetti (rischio di inalazione)
- Le soluzioni devono essere conservate in recipienti puliti (lavati e successivamente lasciati asciugare) e tenuti chiusi per evitare il rischio d'inquinamento della soluzione, l'evaporazione del solvente, ecc.
- Diluire le soluzioni disinfettanti con acqua potabile fredda
- Le soluzioni diluite vanno conservate in base alla stabilità dei prodotti indicata sulla scheda tecnica
- Eliminare e ripreparare le soluzioni diluite che si presentano **torbide o visibilmente inquinate**
- Eliminare e ripreparare le soluzioni utilizzate per effettuare un processo di **decontaminazione**
- Vanno **assolutamente evitate** operazioni di rabbocco; non miscelare disinfettanti/antisettici e detergenti
- Le preparazioni galeniche fornite dalla Farmacia, conservate e utilizzate in modo ottimale, sono stabili per un mese
- Ogni disinfettante è potenzialmente un veleno, deve pertanto sempre essere conservato **in armadi chiusi** a chiave o comunque non raggiungibili dai pazienti
- Non usare i disinfettanti come agenti detergenti o deodoranti
- Usare i disinfettanti rispettando le indicazioni di concentrazione, tempo di contatto e destinazione d'uso specifica
- Evitare operazioni di **travaso** in contenitori diversi da quelli predisposti dal servizio di farmacia
- Pulire ed asciugare accuratamente il contenitore del disinfettante prima di essere nuovamente riempito; i contenitori non devono essere rabboccati con nuova soluzione disinfettante se non è avvenuta la pulizia
- Non far venire a contatto la bocca del contenitore con garze, batuffoli di cotone, mani, ecc.
- Chiudere il più presto possibile il contenitore dopo l'uso
- La disinfezione non deve essere considerata sostitutiva della sterilizzazione per gli strumenti e materiali per i quali è richiesto, come requisito, la sterilità
- Gli strumenti chirurgici non devono mai essere conservati in soluzione disinfettante (es. klemmer o bisturi immersi in disinfettante)
- Manipolare i disinfettanti concentrati o diluiti con le adeguate protezioni (guanti, visiera, ecc..)

6.1.3 Raccomandazioni per "gli oggetti" in base alla "criticità"

Il riuso degli oggetti prevede la riflessione sulla "criticità" del dispositivo. La criticità indica la difficoltà nell'eliminazione di tutti i contaminanti presenti sul dispositivo, difficoltà relativa alla natura del materiale del dispositivo stesso, alla carica microbica presente ed alle caratteristiche del paziente trattato o da trattare con il dispositivo; quindi essa è espressione del grado di rischio infettivo del dispositivo stesso.

Gli strumenti per la cura del paziente sono convenzionalmente classificati in tre categorie secondo il grado di rischio d'infezione ad essi correlato (da Spaulding 1972, Spaulding et al. 1977).

Tab. 2: Suddivisione degli articoli sanitari in base al rischio infettivo connesso al loro uso

<u>ARTICOLI CRITICI</u>	<u>ARTICOLI SEMICRITICI</u>	<u>ARTICOLI NON CRITICI</u>
Comprendono tutti gli strumenti o gli oggetti il cui normale utilizzo prevede l'introduzione diretta nel circolo ematico o in parti del corpo umano normalmente sterili	Sono tali tutti gli strumenti e gli oggetti che entrano a contatto con le mucose. E' richiesta la distruzione dei comuni batteri vegetativi, della gran parte delle spore fungine, dei bacilli tubercolari e dei virus	Comprendono strumenti e oggetti che non vengono a contatto con il malato oppure entrano in contatto solo con la cute integra
<u>Requisiti richiesti:</u> è indispensabile la <u>sterilità</u>	<u>Requisiti richiesti: la sterilizzazione è desiderabile</u> ma nella gran parte dei casi un'accurata pulizia e <u>disinfezione</u> ad alto livello garantiscono, con un ragionevole grado di sicurezza, che l'assenza di microrganismi patogeni (spore escluse)	<u>Requisiti richiesti:</u> riduzione della carica batterica a livelli minimi; pertanto risulta utile una <u>accurata pulizia</u>

<p style="text-align: center;"> SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3 </p>	<p> Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale </p>	<p> Pag. 11 P.T. 01/07 REV. 01 </p>
---	--	--

6.1.4 Raccomandazioni per lo smaltimento di antisettici e disinfettanti

Le raccomandazioni relative allo smaltimento del prodotto concentrato e/o diluito, riportate in ogni singola scheda parte integrante della procedura, sono state ricavate dalle schede di sicurezza delle sostanze antisettiche/disinfettanti. Si ricorda, per ragioni di completezza, che alla luce del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamentazione recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" i disinfettanti scaduti o comunque da eliminare rientrano nella categoria "**RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO**" (vedi **allegato 5**) e vanno smaltiti in **taniche COLORATE (ES. "GIALLE") da 20 Lt con la dicitura R** (se necessario acquisire ulteriori informazioni contattare la **Direzione Sanitaria**).

Il contenitore di origine, salvo specifiche indicazioni, deve essere smaltito previo risciacquo, come plastica riciclabile.

7. Riferimenti bibliografici

- 1) Manuale di uso e di manutenzione della vasca da parto "Seagull medica"
- 2) ASL 3 Guida all'impiego delle soluzioni antisettiche e disinfettanti. Dicembre 2000
- 3) ASL 3 Guida alla pulizia, sanificazione e disinfezione in ospedale. Settembre 1998
- 4) Linee guida di comportamento per gli operatori Sanitari per il controllo dell'infezione da HIV, nelle strutture di diagnosi e di cura, Ministero della sanità, Commissione Nazionale per la lotta contro l'AIDS, ROMA, 6 Aprile 1989.
- 5) Protocollo operativo per trattamento di Tonometri, ospedale civile di ASTI, 1998.
- 6) Protocollo operativo per trattamento di Tonometri, pg. 52 del prontuario Disinfettanti, ospedale Novi Ligure, 1998.
- 7) Uso corretto degli antisettici e dei disinfettanti, ASL Viterbo, rev. 01/2004
- 8) Igiene e disinfezione clinica nelle strutture ospedaliere, principi e tecniche applicate per gli anni 2000. A. Raitano, C. Curti, G. Agolini, Kappadue edizioni, II edizione, maggio 2004
- 9) Schede tecniche e di sicurezza dei disinfettanti/antisettici
- 10) Schede tecniche di apparecchi e strumenti

8. Registrazione ed archiviazione

8.1 Presso i reparti e servizi ospedalieri dell'ASL 3

Il presente documento deve essere presente presso **tutte** le UU.OO. e i servizi ed i distretti dell'ospedale Maria Vittoria e del Comprensorio Ospedaliero Amedeo di Savoia e Birago di Vische, ed archiviato in luogo facilmente accessibile a tutti gli operatori sanitari.

Il documento deve essere reso disponibile durante le visite di controllo effettuate dalle Direzioni Sanitarie e dall'UOa P.R.I.

8.2 Presso l'UOa PRI dell'ASL 3

Il presente documento deve essere presente presso gli uffici dedicati al controllo delle infezioni ospedaliere dell'ospedale Maria Vittoria e del Comprensorio Ospedaliero Amedeo di Savoia e Birago di Vische.

8.3 Presso il SERVIZIO di FARMACIA dell'ASL 3

Il presente documento deve essere presente presso gli il Servizio di Farmacia dell'ospedale Maria Vittoria e del Comprensorio Ospedaliero Amedeo di Savoia e Birago di Vische.

9. Allegati

ALLEGATO N. 1 SCHEDE SINGOLE PER MATERIALE/MANOVRA

ALLEGATO N. 2 PROSPETTO RIASSUNTIVO DILUIZIONE STABILITÀ DEI PRODOTTI

ALLEGATO N. 3 SCHEDE DELLE MOLECOLE DI SINFETTANTI/ANTISETTICHE

ALLEGATO N. 4 SUDDIVISIONE DELL'OSPEDALE IN AREE A DIVERSO GRADO DI RISCHIO

ALLEGATO N. 5 TIPOLOGIE DI RIFIUTI OSPEDALIERI

ALLEGATO N. 6 SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale 3
Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO –
Tel.011/4393111
Codice Fiscale 03127980013
UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO
UOa FARMACIA
UU.OO ASL 3

**Disinfezione di
ambienti, oggetti,
superfici in ospedale**

PAG. 12
P.T. 01/07
REV. 01

ALLEGATO N. 1

SCHEDE SINGOLE PER MATERIALE/MANOVRA

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

ABRASIONI – ESCORIAZIONI

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none">Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">Non previsto
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none">soluzione fisiologica o perossido d'idrogeno 3% (= 10 volumi)
ANTISETTICO	<ul style="list-style-type: none">soluzione acquosa di Iodopovidone al 10% (es. Betadine soluzione)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">/
MODALITÀ	<p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none">Non previsto <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none">Versare a caduta soluzione fisiologica o perossido d'idrogeno al 3%Sciacquare con soluzione fisiologica tra l'applicazione di perossido d'idrogeno e soluzione acquosa di Iodopovidone <p>Antisepsi</p> <ul style="list-style-type: none">Applicare soluzione acquosa di Iodopovidone al 10% (es. Betadine soluzione) con tampone di garza sterile <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">Lasciare asciugare e medicare <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">Non previsto
NORME DI SICUREZZA	<p>IODOPOVIDONE</p> <ul style="list-style-type: none">Evitare l'esposizione a fonti di caloreEvitare l'uso contemporaneo con altri antisettici e/o detergenti (in particolare con Perossidi)Evitare l'uso prolungato per pazienti con problemi tiroideiEvitare l'uso prolungato sui bambini <p>PEROSSIDO DI IDROGENO</p> <ul style="list-style-type: none">Evitare il contatto con gli occhi.Evitare l'uso contemporaneo con altri antisettici (in particolare Iododerivati)
SMALTIMENTO	<p>IODOPOVIDONE - PRODOTTO CONCENTRATO</p> <ul style="list-style-type: none">Rifiuto SpecialeRaccogliere il liquido e smaltire come rifiuto Tossico Speciale secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>PEROSSIDO DI IDROGENO</p> <ul style="list-style-type: none">Il perossido d'idrogeno 3% (= 10 volumi) può essere smaltito nelle acque di scarico; il Prodotto concentrato (= 24 – 36 volumi) deve smaltito come rifiuto Speciale Pericoloso <p>Alla luce del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamentazione recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" i disinfettanti scaduti o comunque da eliminare rientrano nella categoria "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO" e vanno smaltiti in taniche COLORATE (ES. "GIALLE") da 20 Lt con la dicitura R (vedi pag. 11)</p>
NOTE	<ul style="list-style-type: none">Utilizzare tecnica asettica per la conduzione della medicazione

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

AMBU (non autoclavabile)

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none">Se necessario ¹
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">/
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none">Detergente liquido saponoso per stoviglieEnzimi proteolitici (Proteozim PLUS)
DISINFETTANTE	<ul style="list-style-type: none">Ipoclorito di sodio in soluzione al 10% (= 100 ML di Amuchina + 900 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">30', per immersione per Ipoclorito di sodio10 minuti per immersione con Enzimi proteolitici (Proteozym PLUS)
MODALITÀ	<ul style="list-style-type: none">Smontare il pallone in tutte le sue partiDecontaminazione<ul style="list-style-type: none">Non previstoSanificazione<ul style="list-style-type: none">Acqua e detergente liquido saponoso<p><i>oppure</i></p><ul style="list-style-type: none">Enzimi proteolitici (= Proteozym Plus 25 ML in 1 LT di acqua) per almeno 10 minutiSciacquare abbondantementeDisinfezione<ul style="list-style-type: none">Immergere per 30 minuti in Ipoclorito di sodio in soluzione al 10% (= 100 ML Amuchina + 900 ML acqua)Sciacquare con acqua sterileAsciugatura<ul style="list-style-type: none">Con panno pulito o lasciar asciugare spontaneamenteConservazione<ul style="list-style-type: none">In luogo pulito ed asciutto
NORME DI SICUREZZA	<p>IPOCLORITO DI SODIO</p> <ul style="list-style-type: none">Prodotto concentrato: manipolare con guanti, mascherine + visieraProdotto diluito: Nessuna particolare precauzione
SMALTIMENTO	<p>IPOCLORITO DI SODIO</p> <ul style="list-style-type: none">Prodotto diluito: smaltire in rete fognariaProdotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I (CLINICAL BOX)
NOTE	<ul style="list-style-type: none">Prediligere la sterilizzazione dopo la puliziaUtilizzare filtro antibatterico interposto tra maschera e pallone (+ ev. mount)Smontare il pallone in tutte le sue partiUtilizzare i guanti di protezione durante le manovre di ricondizionamento del presidio

¹ LA DECONTAMINAZIONE DI OGGETTI E SUPERFICI DEVE ESSERE EFFETTUATA IN OGNI CASO IN PRESENZA DI PROBABILE O CERTA CONTAMINAZIONE CON MATERIALE ORGANICO (VEDI SCHEDA pag. 41)

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI
DISINFEZIONE

APPARECCHIO DEL CATANI (materiale riutilizzabile per clisteri)

DECONTAMINANTE	▪ Se necessario ¹
TEMPO DI CONTATTO	▪ /
DETERGENTE	▪ Detergente liquido saponoso per stoviglie
DISINFETTANTE	▪ Ipoclorito di Sodio in soluzione al 5% (= 50 ML di Amuchina + 950 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	▪ 30', per immersione
MODALITÀ	<p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Se necessario¹ <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Dopo l'uso trattare con acqua e detergente le parti riutilizzabili▪ Sciacquare▪ Lasciar asciugare <p>Disinfezione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Immergere in Ipoclorito di Sodio in soluzione acquosa al 5% (= 50 ML di Amuchina + 950 ML di acqua), per almeno 30 minuti <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Asciugare con un panno pulito <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Conservare protetto, in luogo pulito ed asciutto
NORME DI SICUREZZA	<p>IPOCLORITO DI SODIO</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto concentrato: manipolare con guanti, mascherine + visiera▪ Prodotto diluito: Nessuna particolare precauzione
SMALTIMENTO	<p>IPOCLORITO DI SODIO</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto diluito: smaltire in rete fognaria▪ Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I (CLINICAL BOX)
NOTE	▪ Utilizzare sonda rettale monouso sterile

¹ LA DECONTAMINAZIONE DI OGGETTI E SUPERFICI DEVE ESSERE EFFETTUATA IN OGNI CASO IN PRESENZA DI PROBABILE O CERTA CONTAMINAZIONE CON MATERIALE ORGANICO (VEDI SCHEDA pag. 41)

**IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI
DISINFEZIONE**

APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI (*aspiratori, pompe peristaltiche, nutripompe, saturimetri, ecc*)

DECONTAMINANTE	▪ Se necessario ¹
TEMPO DI CONTATTO	▪ /
DETERGENTE	▪ Detergente liquido saponoso per stoviglie
DISINFETTANTE	▪ Clorexidina + Cetrimide in soluzione acquosa all'1% (= 10 ML di Baxidin Concentrato + 990 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	▪ Agire per sfregamento e lasciar asciugare
MODALITÀ	<p>Parti fisse:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Disconnettere l'apparecchio dalla rete elettrica▪ Effettuare la pulizia delle superfici con un panno pulito inumidito con soluzione detergente, rimuovendo tutte le tracce di sporcizia, avvalendosi anche di spazzolini o scovolini se necessario▪ Asciugare▪ Trattare tutte le parti con un panno inumidito di Clorexidina + Cetrimide in soluzione acquosa all'1% (= 10 ML di Baxidin Concentrato + 990 ML di acqua).
NORME DI SICUREZZA	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Evitare il contatto con gli occhi.▪ Utilizzare guanti protettivi
SMALTIMENTO	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I (CLINICAL BOX)▪ Prodotto diluito: Smaltire in rete fognaria
NOTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Seguire le avvertenze del produttore dell'apparecchio▪ Per la pulizia periodica di spazzolini e scovolini vedi scheda pag. 35 "CONTENITORI PLURIUSO/DISPENSER RIUTILIZZABILI/SPAZZOLINI, SCOVOLINI"

¹ LA DECONTAMINAZIONE DI OGGETTI E SUPERFICI DEVE ESSERE EFFETTUATA IN OGNI CASO IN PRESENZA DI PROBABILE O CERTA CONTAMINAZIONE CON MATERIALE ORGANICO (VEDI SCHEDA pag. 41)

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI
DISINFEZIONE

ARCELLE

DECONTAMINANTE	▪ Se necessario ¹
TEMPO DI CONTATTO	▪ /
DETERGENTE	▪ Detergente liquido saponoso per stoviglie
DISINFETTANTE	▪ Clorexidina + Cetrimide in soluzione acquosa all'1% (= 10 ML di Baxidin Concentrato + 990 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	▪ 30 minuti, per immersione
MODALITÀ	<p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Se necessario¹ <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Detergere con soluzione saponosa▪ Sciacquare▪ Lasciar asciugare <p>Disinfezione (se ritenuta necessaria)</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Immergere in Clorexidina + Cetrimide soluzione acquosa all'1% (= 10 ML di Baxidin Concentrato + 990 ML di acqua) per almeno 30 minuti <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Asciugare con un panno pulito <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Conservare protette, in luogo pulito ed asciutto
NORME DI SICUREZZA	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Evitare contatto con gli occhi▪ Manipolare con i guanti
SMALTIMENTO	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I (CLINICAL BOX)▪ Prodotto diluito: Smaltire in rete fognaria
NOTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Durante le manovre di ricondizionamento del materiale usare gli adeguati DPI▪ Se è richiesta una situazione di asepsi <u>inviare alla sterilizzazione</u>

¹ LA DECONTAMINAZIONE DI OGGETTI E SUPERFICI DEVE ESSERE EFFETTUATA IN OGNI CASO IN PRESENZA DI PROBABILE O CERTA CONTAMINAZIONE CON MATERIALE ORGANICO (VEDI SCHEDA pag. 41)

**IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI
DISINFEZIONE**

ARREDI (mobili - letti - sedie e suppellettili varie) escluse le incubatrici

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none">Se necessario¹
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">/
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none">Detergente liquido per superfici
DISINFETTANTE	<ul style="list-style-type: none">Clorexidina + Cetrimide in soluzione acquosa all'1% (= 10 ML di Baxidin Concentrato + 990 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">Applicare per sfregamento e lasciare agire per 30 minuti
MODALITÀ	<p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none">Se necessario¹ <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none">Detergere con soluzione detergente liquida per superfici <p>Disinfezione</p> <ul style="list-style-type: none">Utilizzare per contatto Clorexidina + Cetrimide in soluzione acquosa all'1% (= 10 ML di Baxidin Concentrato + 990 ML di acqua) <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">Lasciar asciugare <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">Non prevista
NORME DI SICUREZZA	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">Evitare il contatto con gli occhiManipolare con i guanti
SMALTIMENTO	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I (CLINICAL BOX)Prodotto diluito: Smaltire in rete fognaria
NOTE	<ul style="list-style-type: none">Vedere in dettaglio scheda per superfici dei locali a basso rischio, pag. 81Vedere in dettaglio scheda per superfici dei locali a medio rischio, pag. 79Vedere in dettaglio scheda per superfici dei locali ad alto rischio, pag. 74

¹ LA DECONTAMINAZIONE DI OGGETTI E SUPERFICI DEVE ESSERE EFFETTUATA IN OGNI CASO IN PRESENZA DI PROBABILE O CERTA CONTAMINAZIONE CON MATERIALE ORGANICO (VEDI SCHEDA pag. 41)

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

ASPIRATORI DI SECREZIONI (bocettoni, tappi e prolunqhe)

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Polifenoli in soluzione acquosa all'1% (= 10 ML di Fenplus HWP + 990 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30 minuti, per immersione
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Detergente liquido saponoso per stoviglie
DISINFETTANTE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Clorossidante elettrolitico in soluzione acquosa al 2% (= 20 ML di Antisapril + 980 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30 minuti, per immersione
MODALITÀ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indossare guanti monouso, visiera e camice di protezione ▪ Svuotare i bocettoni dal loro contenuto <p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Riempire con soluzione acquosa di Polifenoli all'1% (= 10 ML di Fenplus HWP + 990 ML di acqua) e lasciare in posa per 30 minuti ▪ Sciacquare <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Detergere con soluzione saponosa ▪ Sciacquare ▪ Lasciar asciugare <p>Disinfezione (se non possibile la sterilizzazione)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Immergere in Clorossidante elettrolitico soluzione acquosa al 2% (= 20 ML di Antisapril + 980 ML di acqua) <u>per 30 minuti</u> <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lasciar asciugare <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Conservare protetto, in luogo pulito ed asciutto
NORME DI SICUREZZA	<p>POLIFENOLI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evitare contatto con occhi e cute ▪ Indossare occhiali, guanti e camici protettivi ▪ Proteggere dalle alte temperature ▪ Non respirare i vapori; utilizzare contenitori chiusi <p>CLOROSSIDANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prodotto concentrato: manipolare con guanti, mascherina + visiera ▪ Prodotto diluito: Nessuna particolare precauzione
SMALTIMENTO	<p>POLIFENOLI - PRODOTTO CONCENTRATO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rifiuto Speciale Pericoloso ▪ Raccogliere il liquido e smaltire secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>POLIFENOLI - PRODOTTO DILUITO a concentrazione < 1%</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rifiuto Speciale. Raccogliere il liquido e smaltire secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>Alla luce del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamentazione recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" i disinfettanti scaduti o comunque da eliminare rientrano nella categoria "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO" e vanno smaltiti in taniche COLORATE (ES. "GIALLE") da 20 Lt con la dicitura R (vedi pag. 11)</p> <p>CLOROSSIDANTE - PRODOTTO CONCENTRATO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Smaltire nel contenitore per RSP-I (CLINICAL BOX) <p>CLOROSSIDANTE - PRODOTTO DILUITO AL 2 – 5%</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Smaltire in rete fognaria
NOTE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilizzare i DPI adeguati ▪ Lavare le mani con soluzione antisettica dopo l'operazione ▪ Se possibile è consigliato l'utilizzo di materiale monouso ▪ Se possibile inviare in sterilizzazione dopo decontaminazione e pulizia

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

ATTREZZATURE NON INVASIVE RIUTILIZZABILI

Docce regolabili (aste di sostegno e supporti) per l'immobilizzazione degli arti durante trattamento infusione, archetti sollevacoperte, ausili per la deambulazione (tripodi, stampelle), aste per fleboclisi, borse ghiaccio/acqua calda, materassini antidecubito, fonendoscopi, ecc.

DECONTAMINANTE	▪ Se necessario ¹
TEMPO DI CONTATTO	▪ /
DETERGENTE	▪ Detergente liquido saponoso per stoviglie
DISINFETTANTE	▪ Clorexidina + Cetrimide in soluzione acquosa all'1% (= 10 ML di Baxidin Concentrato + 990 ML di acqua).
TEMPO DI CONTATTO	▪ 30 minuti; applicare per sfregamento e lasciare agire
MODALITÀ	<p><u>Decontaminazione</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Se necessario¹ <p><u>Sanificazione (durante l'uso sullo stesso paziente e prima della disinfezione)</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Acqua tiepida e detergente liquido saponoso▪ Risciacquare <p><u>Disinfezione (nel passaggio tra i vari pazienti)</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Utilizzare Clorexidina + Cetrimide in soluzione acquosa all'1% (= 10 ML di Baxidin Concentrato + 990 ML di acqua) per sfregamento con contatto di 30 minuti <p><u>Asciugatura</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Con un panno pulito o lasciar asciugare <p><u>Conservazione</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ In luogo pulito
NORME DI SICUREZZA	<p><u>CLOREXIDINA</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Evitare il contatto con gli occhi▪ Utilizzare guanti di protezione
SMALTIMENTO	<p><u>CLOREXIDINA</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ <u>Prodotto concentrato</u>: Smaltire nel contenitore per RSP-I (CLINICAL BOX)▪ <u>Prodotto diluito</u>: Smaltire in rete fognaria
NOTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Praticare la sanificazione <u>quotidianamente</u> durante l'utilizzo dell'attrezzatura sullo stesso paziente▪ Praticare inoltre la disinfezione <u>dopo l'utilizzo</u> dell'attrezzatura su paziente affetto da patologia trasmissibile per contatto o nel passaggio tra i vari pazienti

¹ LA DECONTAMINAZIONE DI OGGETTI E SUPERFICI DEVE ESSERE EFFETTUATA IN OGNI CASO IN PRESENZA DI PROBABILE O CERTA CONTAMINAZIONE CON MATERIALE ORGANICO (VEDI SCHEDA pag. 41)

ATTREZZATURE PER IL TRASPORTO DELL'ASSISTITO: CARROZZELLE, BARELLE, SOLLEVAMALATI

DECONTAMINANTE	▪ Se necessario ¹
TEMPO DI CONTATTO	▪ /
DETERGENTE	▪ Detergente liquido per superfici
DISINFETTANTE	▪ Clorexidina + Cetrimide in soluzione acquosa all'1% (= 10 ML di Baxidin Concentrato + 990 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	▪ Applicare per sfregamento e lasciare agire per 30 minuti
MODALITÀ	<p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Se necessario¹ <p>Sanificazione giornaliera</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Detergente liquido per superfici▪ Risciacquare <p>Disinfezione settimanale o quando necessaria</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Utilizzare Clorexidina + Cetrimide in soluzione acquosa all'1% (= 10 ML di Baxidin Concentrato + 990 ML di acqua) <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Lasciar asciugare spontaneamente <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ In luogo pulito
NORME DI SICUREZZA	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Evitare il contatto con gli occhi▪ Utilizzare guanti protettivi
SMALTIMENTO	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I (CLINICAL BOX)▪ Prodotto diluito: Smaltire in rete fognaria
NOTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Prestare attenzione a tutte le componenti dell'ausilio (ruote, freni, manopole ecc..)▪ Praticare quotidiana pulizia e periodica disinfezione▪ Praticare la disinfezione, previa pulizia, se utilizzate su paziente affetto da patologia trasmissibile.

¹ LA DECONTAMINAZIONE DI OGGETTI E SUPERFICI DEVE ESSERE EFFETTUATA IN OGNI CASO IN PRESENZA DI PROBABILE O CERTA CONTAMINAZIONE CON MATERIALE ORGANICO (VEDI SCHEDA pag. 41)

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI
DISINFEZIONE

AURICOLARI RIUTILIZZABILI PER OTOSCOPI

DECONTAMINANTE	▪ Se necessario ¹
TEMPO DI CONTATTO	▪ /
DETERGENTE	▪ Detergente liquido saponoso per stoviglie
DISINFETTANTE	▪ Clorexidina + Cetrimide in soluzione acquosa all'1% (= 10 ML di Baxidin Concentrato + 990 ML di acqua).
TEMPO DI CONTATTO	▪ 30 minuti per immersione
MODALITÀ	<p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Se necessario¹ <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Detergente liquido saponoso▪ Sciacquare▪ Lasciar asciugare <p>Disinfezione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Immergere in Clorexidina + Cetrimide soluzione acquosa all'1% (= 10 ML di Baxidin Concentrato + 990 ML di acqua), per 30 minuti <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Lasciar asciugare <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ In contenitore chiuso al riparo dalla polvere
NORME DI SICUREZZA	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Evitare il contatto con gli occhi▪ Utilizzare guanti protettivi
SMALTIMENTO	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I (CLINICAL BOX)▪ Prodotto diluito: Smaltire in rete fognaria
NOTE	▪ Se utilizzati auricolari monouso eliminarli dopo ogni utilizzo e trattare l'otoscopio (vedi in dettaglio scheda PAG. 51 "LARINGOSCOPIO/OTOSCOPIO")

BIBERON E TETTARELLE RIUTILIZZABILI

DECONTAMINANTE	▪ Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	▪ Non previsto
DETERGENTE	▪ Detergente liquido saponoso per stoviglie
DISINFETTANTE	▪ Ipoclorito di sodio in soluzione all'1% (= 10 ML di Milton + 990 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	▪ 90 minuti, per immersione
MODALITÀ	<p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Non previsto <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Lavare con detergente liquido per stoviglie▪ Utilizzare uno scovolino se necessario▪ Risciacquare abbondantemente <p>Disinfezione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Immergere in Ipoclorito di sodio in soluzione all'1% (= 10 ML di Milton + 990 ML di acqua)▪ Abbondante risciacquo con acqua potabile <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Non previsto <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Lasciarli immersi nella soluzione disinfettante tra i vari utilizzi
NORME DI SICUREZZA	<p>IPOCLORITO</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto concentrato: manipolare con guanti, mascherina + visiera▪ Prodotto diluito: Nessuna particolare precauzione
SMALTIMENTO	<p>IPOCLORITO</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I (CLINICAL BOX)▪ Prodotto diluito al 5 – 10%: smaltire in rete fognaria
NOTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Lasciare immersi i biberon e le tettarelle tra i vari utilizzi▪ Il tempo di contatto minimo con il disinfettante deve essere di <u>60 minuti</u>▪ Abbondante risciacquo con acqua potabile▪ La soluzione deve essere sostituita ogni 24 ore▪ Per trattamento di Scovolini, vedi in dettaglio scheda pag. 35 "CONTENITORI PLURIUSO, DISPENSER RIUTILIZZABILI, SPAZZOLINI, SCOVOLINI"

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3	Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale	Pag. 24 P.T. 01/07 REV. 01
--	---	---

**IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI
DISINFEZIONE**

CAMPO OPERATORIO

Vedi **cute integra** preparazione, [scheda pag. 37](#)

CANNULE OROFARINGEE RIUTILIZZABILI (cannule di Mayo)

DECONTAMINANTE	▪ Se necessario ¹
TEMPO DI CONTATTO	▪ /
DETERGENTE	▪ Detergente liquido saponoso per stoviglie
DISINFETTANTE	▪ Ipoclorito di Sodio in soluzione acquosa al 10% (= 100 ML di Amuchina + 900 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	▪ 30 minuti , per immersione
MODALITÀ	<p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Se necessario¹ <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Acqua e detergente liquido saponoso usando uno scovolino per il canale▪ Sciacquare abbondantemente <p>Disinfezione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Immergere in Ipoclorito di Sodio soluzione acquosa al 10% (= 100 ML di Amuchina + 900 ML di acqua), per 30 minuti▪ Sciacquare con acqua sterile <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Con panno pulito o lasciar asciugare spontaneamente <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ In contenitore chiuso al riparo dalla polvere
NORME DI SICUREZZA	<p>IPOCLORITO DI SODIO</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto concentrato: manipolare con guanti, mascherina + visiera▪ Prodotto diluito: Nessuna particolare precauzione
SMALTIMENTO	<p>IPOCLORITO DI SODIO</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I (CLINICAL BOX)▪ Prodotto diluito: smaltire in rete fognaria
NOTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Preferire il ricorso a materiale monouso▪ La soluzione deve essere sostituita ogni 24 ore▪ Se possibile inviare in sterilizzazione▪ Per trattamento di Scovolini, vedi in dettaglio scheda pag. 35 "CONTENITORI PLURIUSO, DISPENSER RIUTILIZZABILI, SPAZZOLINI, SCOVOLINI"

¹ LA DECONTAMINAZIONE DI OGGETTI E SUPERFICI DEVE ESSERE EFFETTUATA IN OGNI CASO IN PRESENZA DI PROBABILE O CERTA CONTAMINAZIONE CON MATERIALE ORGANICO (VEDI SCHEDA pag. 41)

CAPEZZOLI - DETERSIONE NELL'ALLATTAMENTO

DECONTAMINANTE	▪ Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	▪ Non previsto
DETERGENTE	▪ Detergente liquido tipo <u>Saugella</u>
ANTISETTICO	▪ Ipoclorito di Sodio in soluzione acquosa al 5% (= 50 ML di Amukine MED + 950 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	▪ Per tamponamento
MODALITÀ	<p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Non previsto <p>Detersione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prima e dopo l'allattamento, tamponare il capezzolo con un tampone di cotone imbevuto di detergente <p>Disinfezione (<i>solo in caso di lesioni al capezzolo</i>)</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tamponare con soluzione a base di Ipoclorito di Sodio, in soluzione acquosa al 5% (= 50 ML di Amukine MED + 950 ML di acqua) <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">▪ con panno pulito o con garze pulite <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Non previsto
NORME DI SICUREZZA	<p>IPOCLORITO DI SODIO</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto concentrato: manipolare con guanti, mascherina + visiera▪ Prodotto diluito: Nessuna particolare precauzione
SMALTIMENTO	<p>IPOCLORITO DI SODIO</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I (CLINICAL BOX)▪ Prodotto diluito: smaltire in rete fognaria
NOTE	▪ La soluzione di ipoclorito di sodio (Amukine Med) viene predisposta dal servizio di Farmacia in confezione da 1 Lt.

CAPPE DI CLASSE II (RISCHIO BIOLOGICO)

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none">Se necessario¹
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">/
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none">Non previsto
DISINFETTANTE	<ul style="list-style-type: none">Alcool Etilico 70°
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">Per nebulizzazione e per sfregamento
MODALITÀ	<p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none">In caso di spargimento accidentale di materiale ricoprire con panno monouso, imbibire con soluzione decontaminante e lasciare agire 30 minuti <p>Sanificazione/Disinfezione ogni fine turno di lavoro o quando necessario</p> <ul style="list-style-type: none">Liberare la superficie della cappaNebulizzare sulle pareti l'alcool etilico a 70°Spegnere la cappa ed accendere gli UV <p>Il mattino successivo</p> <ul style="list-style-type: none">Aprire la cappaAccenderlaImbibire un panno monouso o garza non sterile con alcool etilico a 70° e passare l'interno della cappa partendo dall'alto verso il basso e dalla periferia verso il centroRipetere l'operazione all'esterno della cappa cambiando panno <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">Asciugare con cura <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">Non previsto
NORME DI SICUREZZA	<p>ALCOOL</p> <ul style="list-style-type: none">Conservare lontano da fonti di calore ed in locali ben ventilatiManipolare lontano da fiamme e scintilleNon fumare
SMALTIMENTO	<p>ALCOOL</p> <ul style="list-style-type: none">Smaltire tramite incenerimento <p>Alla luce del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamentazione recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" i disinfettanti scaduti o comunque da eliminare rientrano nella categoria "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO" e vanno smaltiti in taniche COLORATE (ES. "GIALLE") da 20 Lt con la dicitura R (vedi pag. 11)</p>
NOTE	<ul style="list-style-type: none">Spegnere la lampada UV prima di lavorare sotto la cappaAttenersi alle procedure di sicurezze e di manutenzione specifiche per la cappa in dotazione.Le operazioni di pulizia e di disinfezione devono avvenire a cappa accesaLe soluzioni di Alcool Etilico a 70° devono essere richieste al servizio di Farmacia

¹ LA DECONTAMINAZIONE DI OGGETTI E SUPERFICI DEVE ESSERE EFFETTUATA IN OGNI CASO IN PRESENZA DI PROBABILE O CERTA CONTAMINAZIONE CON MATERIALE ORGANICO (VEDI SCHEDA pag. 41)

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI
DISINFEZIONE

CAPPE A FLUSSO LAMINARE VERTICALE (SPECIFICO PER CHEMIOTERAPICI)

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none">• Ipoclorito di Sodio in soluzione acquosa al 10% (= 100 ML di Amuchina + 900 ML di acqua), per versamento accidentale di citostatico (RIPETERE L'OPERAZIONE PER 3 VOLTE)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">▪ 30 minuti
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Clorexidina + Cetrimide in soluzione acquosa all'1% (= 10 ML di Baxidin Concentrato + 990 ML di acqua)
DISINFETTANTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Alcool Etilico 70°
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">▪ Per sfregamento
MODALITÀ	<p>Decontaminazione(per spandimento accidentale di chemioterapico)</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Ipoclorito di Sodio in soluzione acquosa al 10% (= 100 ML di Amuchina + 900 ML di acqua), <p>Sanificazione ogni fine turno di lavoro e quando necessario</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Utilizzare detergente modicamente abrasivo ed a basso potere schiumogeno <p>Disinfezione Ogni inizio di turno di lavoro e quando necessario</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Imbibire un panno monouso o garza non sterile con soluzione di Clorexidina + Cetrimide all'1% (= 10 ML di Baxidin Concentrato + 990 ML di acqua) oppure con Alcool Etilico 70° e disinfettare l'interno della cappa partendo dall'alto verso il basso e dalla periferia verso il centro▪ Attendere 20 – 30 minuti prima di iniziare l'attività lavorativa▪ Ripetere l'operazione all'esterno della cappa cambiando il panno <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Lasciar asciugare <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Non previsto
NORME DI SICUREZZA	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Evitare il contatto con gli occhi▪ Utilizzare guanti di protezione <p>IPOCLORITO</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto concentrato: manipolare con guanti, mascherina + visiera▪ Prodotto diluito: Nessuna particolare precauzione
SMALTIMENTO	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I▪ Prodotto diluito: smaltire in rete fognaria <p>IPOCLORITO</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I (CLINICAL BOX)▪ Prodotto diluito al 5 – 10%: smaltire in rete fognaria
NOTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Attenersi alle procedure di sicurezze e di manutenzione specifiche per la cappa in dotazione.▪ In caso di versamento accidentale di Chemioterapico, trattare il versamento con una soluzione di IPOCLORITO DI SODIO al 10%, ripetendo l'operazione per 3 volte.▪ Le operazioni di pulizia e di disinfezione devono avvenire a cappa accesa▪ Le soluzioni di Alcol Etilico a 70° e di Ipoclorito di Sodio al 10% devono essere richieste al servizio di Farmacia

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

CARRELLI ED ATTREZZATURE PER IL TRASPORTO DEI MATERIALI

Carrelli per medicazioni, carrelli per terapia, carrelli trasporto alimenti, contenitore per trasporto di provette e/o campioni biologici

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none">Se necessario¹
TEMPO DI CONTATTO	/
DETERGENTE	Detergente liquido saponoso per stoviglie
DISINFETTANTE	<ul style="list-style-type: none">Clorexidina + Cetrimide in soluzione acquosa all'1% (= 10 ML di Baxidin Concentrato + 990 ML di acqua).
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">30 minuti, applicare per sfregamento e lasciar agire
MODALITÀ	<p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none">Se necessario¹ <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none">Dopo l'utilizzo liberare completamente il carrello dal contenutoEffettuare la pulizia con acqua e detergente liquido saponoso per stoviglie <p>Disinfezione</p> <ul style="list-style-type: none">Clorexidina + Cetrimide in soluzione acquosa all'1% (= 10 ML di Baxidin Concentrato + 990 ML di acqua).Per sfregamento <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">Lasciar asciugare oppure asciugare con panno pulito dopo almeno 30 minuti di contatto <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">Non previsto
NORME DI SICUREZZA	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">Evitare il contatto con gli occhiUtilizzare guanti di protezione
SMALTIMENTO	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-IProdotto diluito: smaltire in rete fognaria
NOTE	<ul style="list-style-type: none">Utilizzare i DPI adeguati

¹ LA DECONTAMINAZIONE DI OGGETTI E SUPERFICI DEVE ESSERE EFFETTUATA IN OGNI CASO IN PRESENZA DI PROBABILE O CERTA CONTAMINAZIONE CON MATERIALE ORGANICO (VEDI SCHEDE pag. 41)

CATETERISMO VENOSO CENTRALE (inserimento/medicazione)

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none"> Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> Non previsto
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none"> Detergente per la pulizia della cute (es. Saugella)
ANTISETTICO	<ul style="list-style-type: none"> Soluzione di Iodopovidone al 10% (Braunoderm spray o Betadine soluzione) Clorexidina allo 0,5% in soluzione alcolica (Clorexin Tintura)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> 2 minuti
MODALITÀ	<ul style="list-style-type: none"> Lavare le mani con sapone antiseptico Indossare per l'inserimento del CVC copricapo, mascherina, camice sterile, guanti sterili e per la medicazione guanti sterili e mascherina chirurgica <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificare che la zona sede di puntura sia pulita; eventualmente praticare lavaggio della parte con acqua e Saugella <p>Antisepsi</p> <ul style="list-style-type: none"> Eeguire l'antisepsi della cute con soluzione di Iodopovidone al 10% (Braunoderm spray o Betadine soluzione) oppure con Clorexidina allo 0,5% in soluzione alcolica (Clorexin Tintura) Agire per sfregamento con movimenti circolari (direzione centro→ periferia) Lasciare in sede per almeno 2 minuti <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none"> Lasciare asciugare
NORME DI SICUREZZA	<p>ODOPOVIDONE</p> <ul style="list-style-type: none"> Evitare l'esposizione a fonti di calore Evitare l'uso contemporaneo con altri antisettici e/o detersivi Evitare l'uso prolungato per pazienti con problemi tiroidei Evitare l'uso prolungato sui bambini <p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none"> Nessuna particolare precauzione
SMALTIMENTO	<p>ODOPOVIDONE - PRODOTTO CONCENTRATO</p> <ul style="list-style-type: none"> Rifiuto Speciale Raccogliere il liquido e smaltire secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>Alla luce del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamentazione recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" i disinfettanti scaduti o comunque da eliminare rientrano nella categoria "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO" e vanno smaltiti in taniche COLORATE (ES. "GIALLE") da 20 Lt con la dicitura R (vedi pag. 11)</p> <p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none"> Smaltire in rete fognaria
NOTE	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare i DPI adeguati Allestire un campo sterile con i telini Inserire il catetere Applicare medicazione sterile pronta all'uso o membrana protettiva trasparente in poliuretano Annotare la data d'inserzione Controllare il sito quotidianamente con una leggera palpazione Ispezionare visivamente il sito d'inserimento giornalmente ed in presenza di sintomi d'infezione, febbre senza cause evidenti, o batteriemia rimuovere la medicazione In pazienti che hanno voluminose medicazioni che impediscono la palpazione o la visione diretta del sito d'inserimento, rimuovere la medicazione e ispezionare visivamente almeno una volta al giorno e quindi riapplicare una nuova medicazione Cambiare la medicazione quando è sporca, si stacca o si bagna previa antisepsi con iodofori o con clorexidina allo 0,5% in soluzione alcolica In assenza di diverse indicazioni rinnovare la medicazione semipermeabile trasparente ogni max. 7 gg e ogni max. 72 ore la medicazione in garza Vedi in dettaglio procedura specifica "PREVENZIONE DELLE INFEZIONI ASSOCIATE A CATETERE INTRAVASCOLARE -2003" - www.pri-asl3to.it -

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

CATERISMO VENOSO PERIFERICO

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none"> Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> Non previsto
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none"> Detergente liquido per la cute (es. Saugella)
ANTISETTICO	<ul style="list-style-type: none"> Soluzione di Iodopovidone al 10% (Braunoderm spray o Betadine soluzione) Soluzione di Clorexidina allo 0,5% in soluzione Alcolica (Clorexin Tintura)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> 2 minuti
MODALITA'	<ul style="list-style-type: none"> Lavare le mani con sapone liquido Indossare guanti sterili <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificare che la zona sede di puntura sia pulita; eventualmente praticare lavaggio della parte con acqua e Saugella <p>Antisepsi</p> <ul style="list-style-type: none"> Eseguire l'antisepsi della cute con soluzione di Iodopovidone al 10% (Braunoderm spray o Betadine soluzione) oppure con Clorexidina allo 0,5% in soluzione alcolica (Clorexin Tintura) Agire per sfregamento con movimenti circolari (direzione centro → periferia) Lasciare in sede per almeno 2 minuti <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none"> Lasciare asciugare o tamponare con garza sterile
NORME DI SICUREZZA	<p>IODOPOVIDONE</p> <ul style="list-style-type: none"> Evitare l'esposizione a fonti di calore Evitare l'uso contemporaneo con altri antisettici e/o detergenti Evitare l'uso prolungato per pazienti con problemi tiroidei Evitare l'uso prolungato sui bambini <p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none"> Nessuna particolare precauzione
SMALTIMENTO	<p>IODOPOVIDONE - PRODOTTO CONCENTRATO</p> <ul style="list-style-type: none"> Rifiuto Speciale Raccogliere il liquido e smaltire secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>Alla luce del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamentazione recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" i disinfettanti scaduti o comunque da eliminare rientrano nella categoria "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO" e vanno smaltiti in taniche COLORATE (ES. "GIALLE") da 20 Lt con la dicitura R (vedi pag. 11)</p> <p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none"> Smaltire in rete fognaria
NOTE	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare i DPI adeguati Scegliere il sito d'inserzione possibilmente evitando gli arti inferiori Inserire e fissare l'ago cannula Coprire il sito con medicazione sterile o membrana protettiva trasparente in poliuretano Se necessario fissare ulteriormente la cannula con cerotto anallergico Annotare la data d'inserzione Ispezionare il sito quotidianamente con una leggera palpazione Cambiare la medicazione al cambio dell'ago cannula ogni 48-72 ore In caso di utilizzo di medicazione trasparente rinnovare max. ogni 7 gg Vedi in dettaglio procedura specifica "PREVENZIONE DELLE INFEZIONI ASSOCIATE A CATETERE INTRAVASCOLARE -2003" - www.pri-asl3to.it -

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

CATETERISMO VESCICALE, antisepsi del meato urinario

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none"> Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> Non previsto
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none"> Detergente intimo per cute e mucose (es. Saugella)
ANTISETTICO	<ul style="list-style-type: none"> Clorexidina soluzione 0,05% (Neoxinal pronto sterile buste 25 ML) Clorexidina soluzione 0,015%+ Cetrimide (Farvicett sterile buste 25 ML) Iodopovidone soluzione acquosa al 10% (Betadine soluzione)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> 2 - 3 minuti
MODALITÀ	<p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none"> Effettuare la detersione dei genitali con acqua e detergente intimo (es. Saugella) <p>Antisepsi</p> <ul style="list-style-type: none"> Clorexidina soluzione 0,05% (Neoxinal pronto sterile buste 25 ML) oppure Clorexidina soluzione 0,015% + Cetrimide (Farvicett sterile buste 25 ML per azione combinata di detersione ed antisepsi) oppure Iodopovidone soluzione 10% (Betadine soluzione) Trattare la zona genitale per 2-3 minuti, con un tampone di garza sterile, imbevuto di antiseptico <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none"> Lasciare asciugare
NORME DI SICUREZZA	<p>IODOPOVIDONE</p> <ul style="list-style-type: none"> Evitare l'esposizione a fonti di calore Evitare l'uso contemporaneo con altri antiseptici e/o detergenti Evitare l'uso prolungato per pazienti con problemi tiroidei Evitare l'uso prolungato sui bambini <p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none"> Nessuna particolare precauzione particolare
SMALTIMENTO	<p>IODOPOVIDONE - PRODOTTO CONCENTRATO</p> <ul style="list-style-type: none"> Rifiuto Speciale Raccogliere il liquido e smaltire secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>Alla luce del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamentazione recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" i disinfettanti scaduti o comunque da eliminare rientrano nella categoria "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO" e vanno smaltiti in tanche COLORATE (ES. "GIALLE") da 20 Lt con la dicitura R (vedi pag. 11)</p> <p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none"> Smaltire in rete fognaria
NOTE	<ul style="list-style-type: none"> Praticare sempre la pulizia prima dell'antisepsi di cute e mucose

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

CATETERISMO VESCICALE- tecnica

<p>DECONTAMINANTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non previsto
<p>TEMPO DI CONTATTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non previsto
<p>DETERGENTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non previsto
<p>ANTISETTICO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Clorexidina soluzione 0,05% (Neoxinal pronto sterile buste 25 ML) ▪ Clorexidina soluzione 0,015%+ Cetrimide (Farvicett sterile buste 25 ML) ▪ Iodopovidone soluzione acquosa al 10% (Betadine soluzione)
<p>TEMPO DI CONTATTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 – 3 minuti
<p>MODALITA'</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pulire l'area perineale con acqua e detergente intimo a pH idoneo (3 - 5,5) ▪ Far assumere al paziente la posizione in decubito dorsale ▪ Eseguire il lavaggio antisettico delle mani ▪ Predisporre un piano di lavoro per l'apertura del materiale per il cateterismo vescicale (due paia di guanti in vinile, garze, bocconcini, antisettico, lubrificante, telino e telino fenestrato) ▪ Indossare il primo paio di guanti sterili ▪ Bagnare i batuffoli e/o le garze con la soluzione antisettica ▪ Coprire la zona dei genitali con due teli da porre sulla faccia interna delle cosce ▪ Procedere all'antisepsi dei genitali (es. Per la donna: in un unico passaggio dall'alto verso il basso divaricando le grandi labbra con le due garze, con il primo e il secondo tampone le piccole, con il terzo lo sbocco dell'uretra. Posizionare la terza garza sotto il meato uretrale in modo che il catetere durante l'introduzione non strisci sui genitali) ▪ Rimuovere il primo paio di guanti e indossare il secondo paio sterili ▪ Raccordare il catetere vescicale al sistema di drenaggio ▪ Prendere con una garza sterile la fiala di soluzione fisiologica precedentemente aperta, aspirare il contenuto con una siringa sterile, rimuovere l'ago e raccordare la siringa all'apposito condotto del catetere e infine provare la tenuta del palloncino ▪ Lubrificare la punta del catetere per almeno 2 cm ▪ Introdurre il catetere nell'uretra fermarsi al deflusso di urina ▪ Iniettare la soluzione nel palloncino di ancoraggio e sraccordare la siringa ▪ Accertarsi che il catetere sia ben fissato, tirandolo delicatamente verso di sé ▪ Rimuovere i teli ed eliminare il materiale utilizzato ▪ Togliere i guanti ed eliminarli ▪ Fissare il catetere con cerotto: il catetere resta fissato alla faccia interna della coscia per la donna e ribaltato verso l'alto e fissato sull'addome per il maschio ▪ Fissare la sacca di raccolta delle urine al letto del paziente e controllare che il flusso di urina non incontri ostacoli ▪ Sistemare il paziente in una posizione comoda ▪ Riordinare il materiale.
<p>NORME DI SICUREZZA</p>	<p>IODOPOVIDONE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evitare l'esposizione a fonti di calore ▪ Evitare l'uso contemporaneo con altri antisettici e/o detergenti ▪ Evitare l'uso prolungato per pazienti con problemi tiroidei e sui bambini <p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nessuna particolare precauzione particolare
<p>SMALTIMENTO</p>	<p>IODOPOVIDONE - PRODOTTO CONCENTRATO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rifiuto Speciale ▪ Raccolgere il liquido e smaltire secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>Alla luce del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamentazione recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" i disinfettanti scaduti o comunque da eliminare rientrano nella categoria "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO" e vanno smaltiti in taniche COLORATE (ES. "GIALLE") da 20 Lt con la dicitura R (vedi pag. 11)</p> <p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Smaltire in rete fognaria
<p>NOTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilizzare i DPI adeguati ▪ Vedi in dettaglio procedura specifica "PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DELLE VIE URINARIE ASSOCIATE AL CATETERISMO VESCICALE – 2003" – www.pri-asl3to.it -

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

CAVO ORALE (antisepsi)

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none">Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">Non previsto
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none">Non previsto
ANTISETTICO	<ul style="list-style-type: none">Acqua ossigenata al 3% pari a 10 volumiClorexidina collutorio 0,5% - 1%Esetidina (Oraseptic)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">Non previsto
MODALITÀ	<p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none">Effettuare igiene dentale con spazzolino e collutorio o antisettico <p>Antisepsi</p> <ul style="list-style-type: none">Trattare il cavo orale per 1-2 minuti con un tampone di garza sterile imbevuto di antisettico (Acqua ossigenata al 3% pari a 10 volumi, o Clorexidina collutorio 0,5% - 1% o Esetidina) <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">Non previsto
NORME DI SICUREZZA	<p>PEROSSIDO DI IDROGENO:</p> <ul style="list-style-type: none">Evitare il contatto con gli occhi <p>CLOREXIDINA COLLUTORIO:</p> <ul style="list-style-type: none">Nessuna particolare precauzione
SMALTIMENTO	<p>PEROSSIDO DI IDROGENO 10 VOLUMI</p> <ul style="list-style-type: none">Smaltire in rete fognaria <p>PEROSSIDO DI IDROGENO 24 – 36 VOLUMI</p> <ul style="list-style-type: none">Smaltire come rifiuto Speciale pericoloso <p>Alla luce del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamentazione recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" i disinfettanti scaduti o comunque da eliminare rientrano nella categoria "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO" e vanno smaltiti in taniche COLORATE (ES. "GIALLE") da 20 Lt con la dicitura R (vedi pag. 11)</p>
NOTE	<ul style="list-style-type: none">Nel paziente sottoposto ad intubazione orotracheale praticare pulizia quotidianaUtilizzare strumento apribocca, se necessarioUtilizzare i DPI adeguati

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI
DISINFEZIONE

CONTENITORI PLURIUSO/DISPENSER RIUTILIZZABILI/SPAZZOLINI, SCOVOLINI

DECONTAMINANTE	▪ Se necessario ¹
TEMPO DI CONTATTO	▪ /
DETERGENTE	▪ Detergente liquido per stoviglie
DISINFETTANTE	▪ Ipoclorito di sodio in soluzione acquosa al 5% (= 50 ML Amuchina + 950 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	▪ 30 minuti, per immersione
MODALITÀ	<p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Se necessario¹ <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Procedere a sanificazione con detergente per stoviglie▪ Sciacquare abbondantemente <p>Disinfezione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Riempire con (o immergere in) acqua potabile fredda ed Ipoclorito di sodio 5% (= 50 ML Amuchina + 950 ML di acqua)▪ Lasciare immerso per 30 minuti <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Con un panno pulito o lasciare asciugare spontaneamente <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ In luogo pulito ed asciutto
NORME DI SICUREZZA	<p>IPOCLORITO DI SODIO</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto concentrato: manipolare con guanti, mascherina + visiera▪ Prodotto diluito: Nessuna particolare precauzione
SMALTIMENTO	<p>IPOCLORITO DI SODIO</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto concentrato: smaltire nel contenitore per RSP-I▪ Prodotto diluito: smaltire in rete fognaria
NOTE	▪ Eliminare la soluzione ogni 24 ore, oppure ogni qualvolta si renda necessario in base al numero delle manipolazioni effettuate

¹ LA DECONTAMINAZIONE DI OGGETTI E SUPERFICI DEVE ESSERE EFFETTUATA IN OGNI CASO IN PRESENZA
DI PROBABILE O CERTA CONTAMINAZIONE CON MATERIALE ORGANICO (VEDI SCHEDA pag. 41)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3	Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale	Pag. 36 P.T. 01/07 REV. 01
--	---	---

**IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI
DISINFEZIONE**

CORDONE OMBELICALE

Vedi Moncone Ombelicale scheda pag. 56

¹ LA DECONTAMINAZIONE DI OGGETTI E SUPERFICI DEVE ESSERE EFFETTUATA IN OGNI CASO IN PRESENZA DI PROBABILE O CERTA CONTAMINAZIONE CON MATERIALE ORGANICO (VEDI SCHEDA pag. 41)

CUTE INTEGRA preparazione all'intervento chirurgico

DECONTAMINANTE	▪ Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	▪ Non previsto
DETERGENTE	▪ Detergente liquido per la cute
ANTISETTICO	▪ Iodopovidone 10% soluzione acquosa (Betadine soluzione)
TEMPO DI CONTATTO	▪ 2 – 3 minuti
MODALITÀ	<p>Sanificazione la sera e/o la mattina precedente l'intervento</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Vedi in dettaglio procedura specifica, scheda PAG. 61 "PREPARAZIONE DEL PAZIENTE CHIRURGICO" <p>Antisepsi</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Antisepsi dell'area operatoria per 2-3 minuti con tampone di garza sterile imbevuto di antiseptico
NORME DI SICUREZZA	<p>IODOPOVIDONE</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Evitare l'esposizione a fonti di calore▪ Evitare l'uso contemporaneo con altri antiseptici e/o detersivi▪ Evitare l'uso prolungato per pazienti con problemi tiroidei▪ Evitare l'uso prolungato sui bambini
SMALTIMENTO	<p>IODOPOVIDONE - PRODOTTO CONCENTRATO:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Rifiuto Speciale▪ Raccogliere il liquido e smaltire secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>Alla luce del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamentazione recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" i disinfettanti scaduti o comunque da eliminare rientrano nella categoria "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO" e vanno smaltiti in taniche COLORATE (ES. "GIALLE") da 20 Lt con la dicitura R (vedi pag. 11)</p>
NOTE	<ul style="list-style-type: none">▪ In caso di allergia allo Iodio utilizzare, per l'antisepsi locale dell'area d'intervento, una soluzione acquosa di Clorexidina all'1% con Blu di Metilene (La preparazione va richiesta al servizio di Farmacia)▪ Vedi in dettaglio procedura specifica "PREPARAZIONE FISICA ALL'INTERVENTO CHIRURGICO 06.1 -2004" - www.pri-asl3to.it -

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI
DISINFEZIONE

CUTE INTEGRA preparazione alla biopsia ed alle punture esplorative

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none">Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">Non previsto
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none">Detergente liquido per la cute o soluzione fisiologica
ANTISETTICO	<ul style="list-style-type: none">Iodopovidone 10% soluzione alcolica (Braunoderm spray)Clorexidina 0,5% soluzione alcolica (Clorexin Tintura)Iodopovidone 10% soluzione acquosa (Betadine soluzione)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">2 minuti
MODALITÀ	<ul style="list-style-type: none">Eeguire il lavaggio antisettico delle mani <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none">Detergere la zona con soluzione fisiologica previa pulizia con detergente saponoso (se necessario) <p>Antisepsi</p> <ul style="list-style-type: none">Antisepsi dell'area sede di puntura per 2 minuti con tampone di garza sterile imbevuto di antisettico. <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">Lasciar asciugare per almeno 2 minuti prima di procedere alla puntura
NORME DI SICUREZZA	<p>CLOREXIDINA</p> <p>Nessuna particolare precauzione</p> <p>IODOPOVIDONE</p> <ul style="list-style-type: none">Evitare l'esposizione a fonti di caloreEvitare l'uso contemporaneo con altri antisettici e/o detergentiEvitare l'uso prolungato per pazienti con problemi tiroideiEvitare l'uso prolungato sui bambini
SMALTIMENTO	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">Smaltire in rete fognaria <p>IODOPOVIDONE - PRODOTTO CONCENTRATO</p> <ul style="list-style-type: none">Rifiuto SpecialeRaccogliere il liquido e smaltire secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>Alla luce del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamentazione recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" i disinfettanti scaduti o comunque da eliminare rientrano nella categoria "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO" e vanno smaltiti in taniche COLORATE (ES. "GIALLE") da 20 Lt con la dicitura R (vedi pag. 11)</p>
NOTE	<ul style="list-style-type: none">Al termine dell'esame coprire il punto di inserimento dell'ago con un cerotto medicatoUtilizzare gli opportuni DPI

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

CUTE INTEGRA per terapia iniettiva intramuscolo o endovena, prelievi venosi o arteriosi, ecc.

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non previsto
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Detergente liquido per la cute o soluzione fisiologica
ANTISETTICO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Clorexidina 0,5% soluzione alcolica (Clorexin Tintura) ▪ Iodopovidone 10% soluzione alcolica (Braunoderm spray) ▪ Clorexidina 0,5% soluzione acquosa preparazione sterile (flacone da 100 ML) per la neonatologia
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30 secondi almeno
MODALITÀ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eseguire il lavaggio antisettico delle mani <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllare il tenore igienico della zona ▪ Eventualmente detergere con soluzione fisiologica previa sanificazione con detergente per la cute (se necessario) <p>Antisepsi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Antisepsi dell'area sede di puntura per almeno 30 secondi con tampone di garza o di cotone imbevuto di antisettico <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lasciar asciugare per almeno 30 secondi
NORME DI SICUREZZA	<p>IODOPOVIDONE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evitare l'esposizione a fonti di calore ▪ Evitare l'uso contemporaneo con altri antisettici e/o detergenti ▪ Evitare l'uso prolungato per pazienti con problemi tiroidei ▪ Evitare l'uso prolungato sui bambini <p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nessuna particolare precauzione
SMALTIMENTO	<p>CLOREXIDINA</p> <p>- Smaltire in rete fognaria</p> <p>IODOPOVIDONE - PRODOTTO CONCENTRATO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rifiuto Speciale ▪ Raccogliere il liquido e smaltire secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>Alla luce del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamentazione recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" i disinfettanti scaduti o comunque da eliminare rientrano nella categoria "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO" e vanno smaltiti in taniche COLORATE (ES. "GIALLE") da 20 Lt con la dicitura R (vedi pag. 11).</p>
NOTE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Al termine dell'esame, eventualmente, coprire il punto di inserimento dell'ago con un cerotto medicato ▪ Utilizzare gli opportuni DPI ▪ Se si utilizza molecola alcolica ridurre i tempi di contatto a 30"

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

CUTE INTEGRA per posizionamento di cannule centrali o periferiche, venose o arteriose

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none">Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">Non previsto
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none">Detergente liquido per la cute o soluzione fisiologica
ANTISETTICO	<ul style="list-style-type: none">Clorexidina 0,5% soluzione alcolica (Clorexin Tintura)Iodopovidone 10% soluzione alcolica (Braunoderm Spray)Iodopovidone 10% in soluzione acquosa (Betadine soluzione)Clorexidina 0,5% soluzione acquosa preparazione sterile (flacone da 10 ML) per la Neonatologia
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">2 minuti
MODALITA'	<ul style="list-style-type: none">Eseguire il lavaggio antiseptico delle mani <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none">Detergere la zona con soluzione fisiologica <p>Antisepsi</p> <ul style="list-style-type: none">per 2 minuti con tampone di garza sterile imbevuto di antiseptico (vedi dettaglio alla voce – Antiseptico-). <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">Lasciar asciugare per almeno 2 minuti
NORME DI SICUREZZA	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">Nessuna particolare precauzione <p>IODOPOVIDONE</p> <ul style="list-style-type: none">Evitare l'esposizione a fonti di caloreEvitare l'uso contemporaneo con altri antiseptici e/o detersiviEvitare l'uso prolungato per pazienti con problemi tiroideiEvitare l'uso prolungato sui bambini
SMALTIMENTO	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">Smaltire in rete fognaria <p>IODOPOVIDONE - PRODOTTO CONCENTRATO</p> <ul style="list-style-type: none">Rifiuto SpecialeRaccogliere il liquido e smaltire secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>Alla luce del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamentazione recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" i disinfettanti scaduti o comunque da eliminare rientrano nella categoria "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO" e vanno smaltiti in taniche COLORATE (ES. "GIALLE") da 20 Lt con la dicitura R (vedi pag. 11)</p>
NOTE	<ul style="list-style-type: none">Al termine dell'esame coprire il punto di inserimento del catetere con una medicazione sterile, preferibilmente trasparenteNon immergere nella soluzione il cotone e/o le garze necessarie per tutto il giornoImbibire un batuffolo per voltaNon toccare il bordo del flacone con il batuffolo di cotone o con garzaUtilizzare gli opportuni DPIVedi in dettaglio procedura specifica "PREVENZIONE DELLE INFEZIONI ASSOCIATE A CATETERE INTRAVASCOLARE -2003" - www.pri-asl3to.it -

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

DECONTAMINAZIONE OGGETTI E SUPERFICI

DECONTAMINANTE	<p>PER METALLI, VETRO, MATERIALE NON POROSO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Polifenoli in soluzione acquosa all'1% (= 10 ML di Fenplus HWP + 990 ML di acqua) in bustine monodose o flacone da 5 LT <p>PER GOMMA, altro MATERIALE POROSO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dicloroisocianurato 0,5% (= 2CPR di BIONIL da 4,6 + 1 LT di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> 30 minuti
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none"> Detergente enzimatico (Proteozim plus) 10 minuti
DISINFETTANTE	<ul style="list-style-type: none"> Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> Non previsto
MODALITÀ	<ul style="list-style-type: none"> Indossare i DPI per le manovre di pulizia e decontaminazione Decontaminazione per immersione o per sfregamento lasciando agire il decontaminante per almeno 30 minuti (scegliendo tra le sottoindicate molecole) indi sciacquare abbondantemente Polifenoli in soluzione acquosa all'1% (= 10 ML di Fenplus HWP + 990 ML di acqua) oppure Dicloroisocianurato 0,5% (= 2CPR di BIONIL da 4,6 + 1 LT di acqua) Sanificazione in presenza di abbondanti quantità di materiale organico immergere in una soluzione di detergente enzimatico per almeno 10 minuti rimuovere i residui di materiale con l'ausilio di spazzolini o scovolini sciacquare sotto acqua corrente Disinfezione In relazione alle caratteristiche dell'oggetto; vedi in dettaglio schede specifiche Asciugatura Asciugare con panni puliti
NORME DI SICUREZZA	<p>POLIFENOLI</p> <ul style="list-style-type: none"> Evitare contatto con occhi e cute Indossare occhiali, guanti e camici protettivi Proteggere dalle alte temperature Non respirare i vapori; utilizzare contenitori chiusi <p>DICLOROISOCIANURATO</p> <ul style="list-style-type: none"> Evitare il contatto con gli occhi Conservare in luogo asciutto fresco e ventilato Non toccare il prodotto con le mani; usare guanti di protezione Non aspirare i fumi una volta applicato (granuli); ventilare l'ambiente
SMALTIMENTO	<p>POLIFENOLI - PRODOTTO CONCENTRATO</p> <ul style="list-style-type: none"> Rifiuto Speciale Pericoloso Raccogliere il liquido e smaltire come rifiuto Tossico Speciale Pericoloso secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>POLIFENOLI - PRODOTTO DILUITO a concentrazione < 1%</p> <ul style="list-style-type: none"> Rifiuto Speciale. Raccogliere il liquido e smaltire secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>DICLOROISOCIANURATO. PRODOTTO CONCENTRATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rifiuto Pericoloso Raccogliere il liquido e smaltire come rifiuto Tossico Nocivo secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>Alla luce del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamentazione recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" i disinfettanti scaduti o comunque da eliminare rientrano nella categoria "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO" e vanno smaltiti in taniche COLORATE (ES. "GIALLE") da 20 Lt con la dicitura R (vedi pag. 11)</p>
NOTE	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare i DPI necessari e lavare le mani dopo aver rimosso i guanti Rinnovare la soluzione decontaminante in uso ogni 24 ore, ed ogni qualvolta sia visibilmente contaminata da materiale organico

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

FERITA CHIRURGICA non TRAUMATICA

DECONTAMINANTE	▪ Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	▪ Non previsto
DETERGENTE	▪ Soluzione fisiologica
ANTISETTICO	▪ Ipoclorito di Sodio in soluzione al 5% (AMUCHINA) ▪ Acqua ossigenata al 3% pari a 10 volumi ▪ Clorexidina 0.015 + cetrimide (Farvicett pronto buste sterili 25 ML) ▪ Iodopovidone 10% soluzione <u>acquosa (Betadine</u> soluzione)
TEMPO DI CONTATTO	▪ 2 - 3 minuti
MODALITÀ	Decontaminazione ▪ Non previsto Sanificazione ▪ Detergere con un tampone di garza sterile e soluzione fisiologica con movimenti dal centro alla periferia ▪ Cambiare il batuffolo ad ogni passaggio Disinfezione ▪ Trattare la cute per 2-3 minuti con un tampone sterile imbevuto di antiseptico tal quale o Ipoclorito di Sodio in soluzione al 5 % (= 50 ML di Amuchina + 950 ML di acqua) con movimenti dal centro alla periferia ▪ Cambiare il batuffolo ad ogni passaggio Asciugatura ▪ Lasciare asciugare e coprire con una medicazione Conservazione ▪ Non previsto
NORME DI SICUREZZA	CLOREXIDINA ▪ Nessuna particolare precauzione IPOCLORITO DI SODIO ▪ Prodotto concentrato: manipolare con guanti, mascherina + visiera ▪ Prodotto diluito: Nessuna particolare precauzione PEROSSIDO DI IDROGENO ▪ Evitare il contatto con gli occhi ODOPOVIDONE ▪ Evitare l'esposizione a fonti di calore ▪ Evitare l'uso contemporaneo con altri antiseptici e/o detergenti ▪ Evitare l'uso prolungato per pazienti con problemi tiroidei ▪ Evitare l'uso prolungato sui bambini
SMALTIMENTO	CLOREXIDINA ▪ Smaltire in rete fognaria IPOCLORITO DI SODIO ▪ Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I (CLINICAL BOX) ▪ Prodotto diluito: smaltire in rete fognaria ODOPOVIDONE - PRODOTTO CONCENTRATO ▪ Rifiuto Speciale ▪ Raccogliere il liquido e smaltire secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) PEROSSIDO DI IDROGENO 10 VOLUMI ▪ Smaltire in rete fognaria PEROSSIDO DI IDROGENO 24 - 36 VOLUMI Smaltire come rifiuto Sanitario Pericoloso Alla luce del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamentazione recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" i disinfettanti scaduti o comunque da eliminare rientrano nella categoria " RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO " e vanno smaltiti in taniche COLORATE (ES. "GIALLE") da 20 Lt con la dicitura R (vedi pag. 11)
NOTE	▪ Utilizzare i DPI adeguati ▪ Utilizzare tecnica sterile oppure tecnica NO-touch per eseguire la medicazione ▪ Medicare per ultime le ferite infette o sospette di esserlo ▪ Praticare lavaggio antiseptico delle mani prima di eseguire l'operazione ▪ Praticare lavaggio sociale delle mani al termine della manovra

FERITA CHIRURGICA TRAUMATICA

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none">Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">Non previsto
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none">Non previsto
ANTISETTICO	<ul style="list-style-type: none">Acqua ossigenata al 3% pari a 10 volumiClorexidina soluzione 0,05% (Neoxinal pronto sterile buste 25 ML)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">2 – 3 minuti
MODALITÀ	<p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none">Non previsto <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none">Detergere con un tampone di garza sterile e soluzione fisiologica con movimenti dal centro alla periferia, oppure versare a caduta la soluzione fisiologica <p>Disinfezione</p> <ul style="list-style-type: none">Trattare la cute per 2-3 minuti con un tampone sterile imbevuto di antisettico <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">Lasciare asciugare e coprire con una medicazione <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">Non previsto
NORME DI SICUREZZA	<p>PEROSSIDO DI IDROGENO</p> <ul style="list-style-type: none">Evitare il contatto con gli occhi <p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">Nessuna particolare precauzione
SMALTIMENTO	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">Smaltire in rete fognaria <p>PEROSSIDO DI IDROGENO 10 VOLUMI</p> <ul style="list-style-type: none">Smaltire in rete fognaria <p>PEROSSIDO DI IDROGENO 24 - 36 VOLUMI</p> <ul style="list-style-type: none">Smaltire come rifiuto Sanitario Pericoloso <p>Alla luce del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamentazione recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" i disinfettanti scaduti o comunque da eliminare rientrano nella categoria "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO" e vanno smaltiti in taniche COLORATE (ES. "GIALLE") da 20 Lt con la dicitura R (vedi pag. 11)</p>
NOTE	<ul style="list-style-type: none">Medicare per ultime le ferite infette o sospette di esserloPraticare lavaggio antisettico delle mani prima e dopo aver eseguito la manovraUtilizzare i DPI adeguati

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI
DISINFEZIONE

FRANGIGETTO, FRANGIFLUSSI, SOFFIONI DOCCIA

DECONTAMINANTE	▪ Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	▪ Non previsto
DISINCROSTANTE	▪ Aceto bianco e/o prodotto anticalcare
DISINFETTANTE	▪ Dicloroisocianurato 0,025% (=1 cpr di BIONIL da 4,6 gr, + 10 LT di acqua fredda) <u>oppure</u> ▪ Ipoclorito di sodio 0,5% (5 ml di Conegrina al 5-6% + 1000 ml di acqua fredda)
TEMPO DI CONTATTO	▪ 30 minuti, per immersione
MODALITÀ	<p>Disincrostazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Immergere i frangiflussi per 30 minuti in soluzione anticalcare o in aceto bianco▪ Sciacquare con acqua fredda <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Non previsto <p>Disinfezione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Immergere i frangiflussi in soluzione a base di Dicloroisocianurato 0,025% (= 1 cpr di BIONIL da 4,6 gr, + 10 LT di acqua fredda) <u>oppure</u>▪ Ipoclorito di sodio 0,5% (5 ml di Conegrina al 5-6% + 1000 ml di acqua fredda)▪ Sciacquare con acqua fredda spazzolando, se necessario, per rimuovere incrostazioni ed impurità <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Lascia asciugare <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Ripristinare tutti i frangiflussi ed i soffioni nelle loro sedi
NORME DI SICUREZZA	<p>DICLOROISOCIANURATO</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Evitare il contatto con gli occhi▪ Conservare in luogo asciutto fresco e ventilato▪ Non toccare il prodotto con le mani; usare guanti di protezione▪ Non aspirare i fumi una volta applicato (granuli); ventilare l'ambiente <p>IPOCLORITO DI SODIO</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto concentrato: manipolare con guanti, mascherina + visiera▪ Prodotto diluito: nessuna precauzione
SMALTIMENTO	<p>DICLOROISOCIANURATO. PRODOTTO CONCENTRATO:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Rifiuto Pericoloso▪ Raccogliere smaltire secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>IPOCLORITO DI SODIO</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I▪ Prodotto diluito: Smaltire in rete fognaria
NOTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Per la frequenza d'esecuzione attenersi alle indicazioni fornite dalla Direzione Sanitaria e dall'UPRI (mensile)▪ Utilizzare i DPI adeguati (guanti, mascherina, occhiali)

FLUSSIMETRI PER OSSIGENO ARIA COMPRESSA E MANOMETRI PER VUOTO

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none">Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">Non previsto
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none">Detergente liquido saponoso per stoviglie oppureDetergente liquido
DISINFETTANTE	<ul style="list-style-type: none">Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">Non previsto
MODALITÀ	<p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none">Non previsto <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none">Detergere con acqua e detergente attraverso un panno inumiditoSciacquare con acqua potabile e panno inumidito <p>Disinfezione</p> <ul style="list-style-type: none">Non previsto <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">AsciugareRimontare le parti <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">In luogo pulito e protetto
NORME DI SICUREZZA	/
SMALTIMENTO	/
NOTE	<ul style="list-style-type: none">Non lasciare flussimetri e gorgogliatori già allestiti (con acqua)

GORGOGLIATORI PER OSSIGENOTERAPIA NON STERILIZZABILI

DECONTAMINANTE	▪ Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	▪ Non previsto
DETERGENTE	▪ Detergente liquido saponoso per stoviglie
DISINFETTANTE	▪ Ipoclorito di Sodio in soluzione acquosa al 5% (= 50 ML di Amuchina + 950 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	▪ 30 minuti
MODALITÀ	<p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Non previsto <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Detergere con acqua e detergente▪ Sciacquare con acqua potabile <p>Disinfezione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Immergere in Ipoclorito di Sodio in soluzione acquosa al 5% (= 50 ML di Amuchina + 950 ML di acqua) per 30 minuti▪ Sciacquare accuratamente con <u>acqua sterile</u> <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Asciugare (se possibile utilizzare pistola ad aria compressa).▪ Rimontare le parti <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ In luogo pulito e protetto
NORME DI SICUREZZA	<p>IPOCLORITO DI SODIO</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto concentrato: manipolare con guanti, mascherina + visiera▪ Prodotto diluito: nessuna precauzione
SMALTIMENTO	<p>IPOCLORITO DI SODIO</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I▪ Prodotto diluito: Smaltire in rete fognaria
NOTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Preferire alla disinfezione la sterilizzazione in autoclave o materiale a perdere▪ Praticare risciacquo finale con acqua distillata sterile▪ Non aggiungere mai acqua al gorgogliatore già in uso; sanificare ed introdurre acqua sterile▪ Non lasciare flussimetri e gorgogliatori già allestiti (con acqua)▪ Rinnovare ogni 24 ore, previa sanificazione, la soluzione presente nel gorgogliatore. Rinnovare occhialini e mascherina ogni 24 ore (Vedi in dettaglio procedura specifica "LA PREVENZIONE DELLE POLMONITI OSPEDALIERE, 2003) - www.pri-asl3to.it -

IGIENE DEI GENITALI DELLE PAZIENTI, DURANTE IL PARTO

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none"> Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> Non previsto
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none"> Detergente a pH 3,5 (Saugella)
ANTISETTICO	<ul style="list-style-type: none"> Clorexidina + Cetrimide in soluzione acquosa all'1% (= 10 ML di Baxidin Concentrato + 990 ML di acqua).
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> Non previsto
MODALITA'	<p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none"> Non previsto <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none"> Igiene intima con acqua e detergente intimo <p>Disinfezione</p> <ul style="list-style-type: none"> Trattare la parte con soluzione acquosa di Clorexidina + Cetrimide (= 2 buste di Baxidin Concentrato + 4950 ML di acqua) <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none"> Lasciare asciugare <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none"> Non previsto
NORME DI SICUREZZA	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none"> Evitare il contatto con gli occhi Utilizzare guanti di protezione
SMALTIMENTO	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none"> Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I Prodotto diluito: smaltire in rete fognaria
NOTE	<ul style="list-style-type: none"> I contenitori utilizzati per la diluizione della soluzione devono essere puliti e asciutti Trattare i contenitori come indicato nella SCHEDA PAG. 35 "CONTENITORI PLURIUSO"

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI
DISINFEZIONE

INCUBATRICE

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none">Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">Non previsto
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none">Detergente liquido saponoso per stoviglie <u>oppure</u>Proteozim Plus (= 25 ml + acqua 975 ml)
DISINFETTANTE	<p>AD INCUBATRICE OCCUPATA, ALMENO 1 vv/DIE, <u>solo</u></p> <ul style="list-style-type: none">Clorexidina + Cetrimide (Baxidin Pronto all'uso) <p>AL TERMINE DELLA DEGENZA oppure OGNI 7 GG, <u>dopo detersione</u></p> <ul style="list-style-type: none">Clorexidina + Cetrimide (Baxidin Pronto all'uso)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">Per sfregamento
MODALITA'	<p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none">Non previsto <p>Sanificazione</p> <p>a. Ad incubatrice occupata praticare la sola disinfezione quotidiana con:</p> <ul style="list-style-type: none">Clorexidina + Cetrimide (Baxidin Pronto all'uso) <p>b. Al termine dell'uso, <u>oppure ogni 7 giorni, oppure in corso di eventi epidemici:</u></p> <ul style="list-style-type: none">Smontare l'incubatrice in tutte le sue partiLavare le parti smontabili con soluzione di Proteozim PlusAsciugare tutte le parti sanificate <p>Disinfezione</p> <p>Procedere a disinfezione di tutte le parti smontate e sanificate e dell'abitacolo con:</p> <ul style="list-style-type: none">Clorexidina + Cetrimide (Baxidin Pronto all'uso) <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">Asciugare con panno pulito <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">Non prevista
NORME DI SICUREZZA	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">Evitare il contatto con gli occhiUtilizzare guanti di protezione
SMALTIMENTO	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-IProdotto diluito: smaltire in rete fognaria
NOTE	<ul style="list-style-type: none">Utilizzare solo acqua sterile per il riempimento della vaschetta di umidificazioneSostituire l'acqua di umidificazione ogni 24 oreNon lasciare l'incubatrice inattiva con acqua presente nella vaschetta di umidificazioneAlmeno 1 volta alla settimana liberare l'incubatrice e procedere ad accurata disinfezione della stessaNon immergere in prodotti a base di cloro (effetti corrosivi)

KIT PER AEROSOL TERAPIA (mascherina o boccaglio, ampolla e tubo)

DECONTAMINANTE	▪ Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	▪ Non previsto
DETERGENTE	▪ Detergente liquido per stoviglie
DISINFETTANTE	▪ Ipoclorito di sodio in soluzione acquosa al 10% (= 100 ML di Amuchina + 900 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	▪ 30 minuti
MODALITÀ	<p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Non previsto <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Detergere mascherina ed ampolla con acqua tiepida e detergente liquido per stoviglie▪ Sciacquare con acqua potabile <p>Disinfezione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Immergere per 30 minuti in soluzione acquosa di Ipoclorito di Sodio al 10% (= 100 ml di Amuchina + 900 ML di acqua)▪ Sciacquare con acqua sterile a caduta al momento dell'uso <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">▪ / <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ /
NORME DI SICUREZZA	<p>IPOCLORITO DI SODIO</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto concentrato: manipolare con guanti, mascherina + visiera▪ Prodotto diluito: nessuna precauzione
SMALTIMENTO	<p>IPOCLORITO DI SODIO</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I▪ Prodotto diluito: Smaltire in rete fognaria
NOTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Datare con pennarello indelebile la data di rinnovo del KIT (uso max. sullo stesso paziente 7 gg)▪ Per praticare l'aerosol terapia collegare il KIT alla fonte di ossigeno (con gorgogliatore vuoto) o alla fonte di aria compressa▪ Trattare i contenitori come da scheda specifica "CONTENITORI PLURIUSO/DISPENSER RIUTILIZZABILI/SPAZZOLINI, SCOVOLINI PAG. 35"▪ Vedi in dettaglio procedura specifica "PREVENZIONE DELLA POLMONITI OSPEDALIERE -2003" - www.pri-asl3to.it -

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

LAME LARINGOSCOPIO

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Polifenoli in soluzione acquosa all'1% (= 10 ML di Fenplus HWP + 990 ML di acqua) in bustine monodose o flacone da 5 LT
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">▪ /
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Detergente liquido per stoviglie
DISINFETTANTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Clorexidina + Cetrimide in soluzione acquosa all'1% (= 10 ML di Baxidin Concentrato + 990 ML di acqua).
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">▪ 2 ore per immersione
MODALITA'	<ul style="list-style-type: none">▪ <u>Indossare guanti di protezione</u>▪ Staccare la lama dall'impugnatura▪ Rimuovere i componenti elettrici (batteria, lampadina, portalampada)▪ Decontaminazione<ul style="list-style-type: none">▪ Immergere in Polifenoli soluzione acquosa all'1% (= 10 ML di Fenplus HWP + 990 ML di acqua) in bustine monodose o flacone da 5 LT▪ Sanificazione<ul style="list-style-type: none">▪ Detergere con acqua e sapone liquido per stoviglie▪ Usare uno spazzolino per pulire bene l'alloggiatura della lampadina▪ Sciacquare ed asciugare▪ Disinfezione<ul style="list-style-type: none">▪ Immergere in soluzione acquosa di Clorexidina + Cetrimide all'1% (= 10 ML di Baxidin Concentrato + 990 ML di acqua), per 2 ore▪ Prelevare con tecnica asettica la lama▪ Sciacquare con <u>acqua distillata</u>▪ Asciugatura<ul style="list-style-type: none">▪ Asciugare con garze sterili▪ Conservazione<ul style="list-style-type: none">▪ Allestire la lama e lampadina▪ Riporre con il manico, in contenitore pulito e chiuso
NORME DI SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none">▪ POLIFENOLI<ul style="list-style-type: none">▪ Evitare contatto con occhi e cute▪ Indossare occhiali, guanti e camici protettivi▪ Proteggere dalle alte temperature▪ Non respirare i vapori; utilizzare contenitori chiusi▪ CLOREXIDINA<ul style="list-style-type: none">▪ Evitare il contatto con gli occhi▪ Utilizzare guanti di protezione
SMALTIMENTO	<ul style="list-style-type: none">▪ POLIFENOLI - PRODOTTO CONCENTRATO<ul style="list-style-type: none">▪ Rifiuto Speciale Pericoloso▪ Raccogliere il liquido e smaltire come rifiuto Tossico Speciale Pericoloso secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione)▪ POLIFENOLI - PRODOTTO DILUITO a concentrazione < 1%<ul style="list-style-type: none">▪ Rifiuto Speciale. Raccogliere il liquido e smaltire secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>Alla luce del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamentazione recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" i disinfettanti scaduti o comunque da eliminare rientrano nella categoria "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO" e vanno smaltiti in taniche COLORATE (ES. "GIALLE") da 20 Lt con la dicitura R (vedi pag. 11)</p> <ul style="list-style-type: none">▪ CLOREXIDINA<ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I▪ Prodotto diluito: smaltire in rete fognaria
NOTE	<ul style="list-style-type: none">▪ E' consigliabile sterilizzare la lama in autoclave

LARINGOSCOPIO - OTOSCOPIO

DECONTAMINANTE	▪ Se necessario ¹
TEMPO DI CONTATTO	▪ /
DETERGENTE	▪ Detergente liquido per superfici
DISINFETTANTE	▪ Clorexidina + Cetrimide in soluzione acquosa all'1% (= 10 ML di Baxidin Concentrato + 990 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	▪ 30 minuti, per fregamento
MODALITÀ	<ul style="list-style-type: none">▪ Indossare guanti di protezione▪ Staccare la lama dall'impugnatura/rimuovere l'auricolare▪ Rimuovere i componenti elettrici (batteria, lampadina, portalampada) <p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Se necessario¹ <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Detergere usando un panno imbevuto di acqua e detergente per superfici▪ Asciugare con panno e/o garze pulite <p>Disinfezione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Sfregare con un panno e/o garza pulita imbevuta soluzione acquosa all'1% di Clorexidina + Cetrimide (= 10 ML di Baxidin Concentrato + 990 ML di acqua) avendo l'accortezza di non bagnare il punto di contatto con la lama <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Asciugare con garza pulita <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Allestire lo strumento di batteria/lampadina▪ Riporre in contenitore pulito e chiuso
NORME DI SICUREZZA	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">- Evitare il contatto con gli occhi- Utilizzare guanti di protezione
SMALTIMENTO	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">- Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I- Prodotto diluito: smaltire in rete fognaria
NOTE	▪ Evitare l'immersione

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

LAVAGGIO ANTISETTICO DELLE MANI

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none"> Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> Non previsto
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none"> Non previsto
ANTISETTICO	<ul style="list-style-type: none"> Clorexidina 4% in soluzione saponosa (Hibiscrub) Iodopovidone 10% soluzione saponosa (Povi Iodine Scrub)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> 1 – 2 minuti
QUANDO	<ul style="list-style-type: none"> Prima e dopo il contatto con ferite Prima e dopo l'esecuzione di manovre invasive Prima e dopo il contatto con pazienti particolarmente a rischio Dopo il contatto con persone e materiale infetto (uscendo dalle stanze d'isolamento)
COME	<ul style="list-style-type: none"> Bagnare le mani Prelevare una dose di antisettico Insaponare e frizionare per almeno 1 - 2 minuti secondo la sequenza: <ul style="list-style-type: none"> Mano "Palmo contro palmo" <ul style="list-style-type: none"> "Palmo contro il dorso", intrecciando le dita "Palmo contro palmo", intrecciando le dita Dita serrate Pollice <ul style="list-style-type: none"> "Dita contro il palmo" Avambracci Fare particolare attenzione agli spazi periungueali e interdigitali Sciacquare con acqua corrente Asciugare con salvietta di carta Usare le stesse salviette per chiudere il rubinetto
NORME DI SICUREZZA	<p>IODOPOVIDONE</p> <ul style="list-style-type: none"> Evitare l'esposizione a fonti di calore Evitare l'uso contemporaneo con altri antisettici e/o detergenti Evitare l'uso prolungato per pazienti con problemi tiroidei Evitare l'uso prolungato sui bambini <p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none"> Evitare il contatto con gli occhi
SMALTIMENTO	<p>IODOPOVIDONE - PRODOTTO CONCENTRATO</p> <ul style="list-style-type: none"> Rifiuto Speciale Raccogliere il liquido e smaltire secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>Alla luce del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamentazione recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" i disinfettanti scaduti o comunque da eliminare rientrano nella categoria "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO" e vanno smaltiti in taniche COLORATE (ES. "GIALLE") da 20 Lt con la dicitura R (vedi pag. 11)</p> <p>CLOREXIDINA</p> <p>Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I</p> <ul style="list-style-type: none"> Prodotto diluito: Smaltire in rete fognaria
NOTE	<ul style="list-style-type: none"> A fine servizio, in presenza di dermatite da contatto, utilizzare Veralga lozione Vedi in dettaglio procedura specifica P05/04 "IL LAVAGGIO DELLE MANI: PROCEDURA OPERATIVA" - www.pri-asl3to.it -

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

LAVAGGIO CHIRURGICO DELLE MANI

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none"> Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> Non previsto
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none"> Non previsto
ANTISETTICO	<ul style="list-style-type: none"> Clorexidina 4% in soluzione saponosa (Hibiscrub) Iodopovidone 10% (Povi Iodine Scrub) Spazzolini monouso sterili da utilizzare con l'antisettico prescelto (Clorexidina 4% o Iodopovidone 10%)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> 3 – 4 minuti almeno
QUANDO	<ul style="list-style-type: none"> Prima degli interventi chirurgici Prima delle procedure altamente invasive
COME	<ul style="list-style-type: none"> Bagnare mani ed avambracci fino a due dita al di sopra della piega del gomito Prelevare una dose d'antisettico Lavare le mani e gli avambracci per circa 2 minuti Risciacquare prima le mani e poi gli avambracci Tenere le mani al di sopra degli avambracci per evitare che l'acqua coli sulle mani Bagnare con antisettico uno spazzolino sterile (o usare uno spazzolino monouso) Spazzolare le unghie per almeno 30 secondi Dorso e mani non vanno spazzolati Al termine lasciare cadere lo spazzolino nel lavabo Risciacquare prima le mani e poi gli avambracci Tenere le mani al di sopra degli avambracci per evitare che l'acqua coli sulle mani Riprendere una nuova dose d'antisettico Lavare accuratamente le mani facendo attenzione agli spazi interdigitali, 1 minuto/mano Lavare ogni avambraccio con movimento circolare per 30 secondi circa Risciacquare con acqua corrente mani ed avambracci Tenere le mani al di sopra degli avambracci per evitare che l'acqua coli sulle mani Asciugare le mani con panno sterile, partendo dalle dita Cambiare il panno sterile, asciugare con movimento circolare gli avambracci fino alla piega del gomito
NORME DI SICUREZZA	<p>ODOPOVIDONE</p> <ul style="list-style-type: none"> Evitare l'esposizione a fonti di calore Evitare l'uso contemporaneo con altri antisettici e/o detergenti Evitare l'uso prolungato per pazienti con problemi tiroidei Evitare l'uso prolungato sui bambini <p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none"> Evitare il contatto con gli occhi
SMALTIMENTO	<p>ODOPOVIDONE - PRODOTTO CONCENTRATO</p> <ul style="list-style-type: none"> Rifiuto Speciale Raccogliere il liquido e smaltire secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>Alla luce del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamentazione recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" i disinfettanti scaduti o comunque da eliminare rientrano nella categoria "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO" e vanno smaltiti in taniche COLORATE (ES. "GIALLE") da 20 Lt con la dicitura R (vedi pag. 11)</p> <ul style="list-style-type: none"> CLOREXIDINA Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I Prodotto diluito: Smaltire in rete fognaria
NOTE	<ul style="list-style-type: none"> In caso di dermatite da guanti e/o antisettico utilizzare, a fine turno lavorativo, Veralga Lozione Vedi in dettaglio procedura specifica P05/04 "IL LAVAGGIO DELLE MANI: PROCEDURA OPERATIVA" - www.pri-asl3to.it -

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI
DISINFEZIONE

LAVAGGIO SEMPLICE DELLE MANI

DECONTAMINANTE	▪ Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	▪ Non previsto
DETERGENTE	▪ Sapone liquido per mani
DISINFETTANTE	▪ Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	▪ 30 secondi almeno
QUANDO	<ul style="list-style-type: none">▪ Prima e dopo le attività che richiedono il contatto diretto con il paziente▪ Dopo il contatto con materiali organici▪ Dopo aver maneggiato padelle, pappagalli, etc.▪ All'inizio e al termine del turno▪ Prima del contatto con cibi e relative stoviglie▪ Per e tra il rifacimento dei letti▪ Per l' applicazione e sostituzione di maschere facciali▪ Prima e dopo l'utilizzo dei guanti▪ Ecc.
COME	<ul style="list-style-type: none">▪ Bagnare le mani▪ Prelevare una dose di sapone▪ Insaponare e frizionare per almeno 30 secondi secondo la sequenza:<ul style="list-style-type: none">▪ <u>Mano</u> "Palmo contro palmo"<ul style="list-style-type: none">▪ "Palmo contro il dorso", intrecciando le dita▪ "Palmo contro palmo", intrecciando le dita▪ <u>Dita serrate</u>▪ <u>Pollice</u><ul style="list-style-type: none">▪ "Dita contro il palmo"▪ <u>Avambracci</u>▪ Fare particolare attenzione agli spazi periungueali e interdigitali▪ Sciacquare con acqua corrente▪ Asciugare con salvietta di carta▪ Usare le stesse salviette per chiudere il rubinetto
NORME DI SICUREZZA	-
SMALTIMENTO	-
NOTE	<ul style="list-style-type: none">▪ A fine servizio, in presenza di dermatite da contatto, utilizzare Veralga lozione▪ Vedi in dettaglio procedura specifica P05/04 "IL LAVAGGIO DELLE MANI: PROCEDURA OPERATIVA" - www.pri-asl3to.it -

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI
DISINFEZIONE

MASCHERE PER PALLONE AMBU

DECONTAMINANTE	▪ Se necessario ¹
TEMPO DI CONTATTO	▪ /
DETERGENTE	▪ Detergente liquido per stoviglie
DISINFETTANTE	▪ Ipoclorito di sodio in soluzione acquosa al 10% (= 100 ML di Amuchina + 900 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	▪ 30' minuti , per immersione
MODALITÀ	<p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Se necessario¹ <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Acqua e detergente liquido saponoso▪ Sciacquare abbondantemente <p>Disinfezione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Immergere in Ipoclorito di sodio in soluzione acquosa al 10% (= 100 ML di Amuchina + 900 ML di acqua) per 30 minuti <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Con panno pulito o lasciar asciugare <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ In contenitore chiuso al riparo dalla polvere
NORME DI SICUREZZA	<p>IPOCLORITO DI SODIO</p> <ul style="list-style-type: none">- Prodotto concentrato: manipolare con guanti, mascherina + visiera- Prodotto diluito: nessuna precauzione
SMALTIMENTO	<p>IPOCLORITO DI SODIO</p> <ul style="list-style-type: none">- Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I- Prodotto diluito: Smaltire in rete fognaria
NOTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Preferire la sterilizzazione quando possibile▪ La soluzione disinfettante deve essere sostituita ogni 24 ore.

¹ LA DECONTAMINAZIONE DI OGGETTI E SUPERFICI DEVE ESSERE EFFETTUATA IN OGNI CASO IN PRESENZA DI PROBABILE O CERTA CONTAMINAZIONE CON MATERIALE ORGANICO (VEDI SCHEDA pag. 41)

**IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI
DISINFEZIONE**

MONCONE OMBELICALE

DECONTAMINANTE	▪ Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	▪ Non previsto
DETERGENTE	▪ /
ANTISETTICO	▪ Argento catadinico (Katoxyn spray) solo in caso di infezione
TEMPO DI CONTATTO	▪ /
MODALITÀ	▪ In caso di moncone infetto applicare una volta al giorno Katoxyn spray
NORME DI SICUREZZA	
SMALTIMENTO	
NOTE	▪ Utilizzare i DPI adeguati

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

PADELLE, PAPPAGALLI, VASINI, ARBARELLE, BACINELLA DELLA SEDIA COMODA (lavaggio manuale in assenza di macchina lavapadelle)

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none">Se necessario¹
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">/
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none">Detergente liquido per stoviglie
DISINFETTANTE	<p>Materiale plastico:</p> <ul style="list-style-type: none">Ipoclorito di Sodio 5% (500 ml di Conegrina 5% + 9500 ml di Acqua) <p>Materiale metallico:</p> <ul style="list-style-type: none">Clorexidina + Cetrimide in soluzione acquosa all'1% (=10 ML di Baxidin Concentrato + 990 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">30 minuti per Ipoclorito di Sodio30 minuti per Clorexidina + Cetrimide
MODALITÀ	<ul style="list-style-type: none">Indossare grembiule o camice di protezione, guanti in gomma oppure doppio paio di guanti in vinile e/lattice <p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none">Non previsto <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none">Lavare ogni singolo presidio con detergente liquido ed acqua tiepidaSciacquare abbondantemente <p>Disinfezione</p> <ul style="list-style-type: none">Immergere nella soluzione predisposta (materiale plastico: Ipoclorito di sodio - materiale metallico: Baxidin Concentrato in soluzione all'1%)Lasciare in immersione come sopra indicatoEstrarre i singoli dispositivi dalla soluzione disinfettante <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">Asciugare con panno pulito o lasciar asciugare <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">In luogo pulito ed asciutto
NORME DI SICUREZZA	<p>IPOCLORITO DI SODIO</p> <ul style="list-style-type: none">Prodotto concentrato: manipolare con guanti, mascherina + visieraProdotto diluito: nessuna particolare precauzione <p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">Evitare il contatto con gli occhimanipolare con i guanti
SMALTIMENTO	<p>IPOCLORITO DI SODIO</p> <ul style="list-style-type: none">Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-IProdotto diluito: Smaltire in rete fognaria <p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-IProdotto diluito: Smaltire in rete fognaria
NOTE	<ul style="list-style-type: none">Ad ogni paziente deve essere fornita padella o pappagallo personalePreferire la disinfezione in apparecchiatura lavapadelleEvitare di inserire nel medesimo contenitore ulteriori presidi prima che il ciclo di disinfezione sia terminatoSe praticata disinfezione chimica per immersione, sostituire la soluzione disinfettante ogni volta che presenta aspetto torbido e comunque almeno ogni 24 oreLavare con acqua e detergente il contenitore ogni qual volta si rinnova la soluzione disinfettanteNon aggiungere nuova soluzione disinfettante a quella presente, rinnovarla totalmente.

¹ LA DECONTAMINAZIONE DI OGGETTI E SUPERFICI DEVE ESSERE EFFETTUATA IN OGNI CASO IN PRESENZA DI PROBABILE O CERTA CONTAMINAZIONE CON MATERIALE ORGANICO (VEDI SCHEDA pag. 41)

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

PEG Gestione

DECONTAMINANTE	▪ Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	▪ Non previsto
DETERGENTE	▪ Detergente liquido tipo Saugella
ANTISETTICO	▪ Non previsto; (vedi procedura specifica per la Gestione della PEG ²)
TEMPO DI CONTATTO	▪ Non previsto
MODALITÀ	<ul style="list-style-type: none">▪ Indossare guanti <u>non</u> sterili▪ Togliere la vecchia medicazione <p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Non previsto <p>Sanificazione /Detersione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Detergere la cute peristomale con garza e soluzione fisiologica con movimento rotatorio dal centro alla periferia <p>Disinfezione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Non previsto (vedi procedura specifica per la Gestione della PEG²) <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Con garza <u>non</u> sterile <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Non previsto
NORME DI SICUREZZA	▪ Nessuna particolare precauzione
SMALTIMENTO	▪ Nessuna particolare precauzione
NOTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Utilizzare gli adeguati DPI (guanti non sterili)▪ <u>La disinfezione della zona</u> deve essere effettuata solo se insorgono complicanze infettive e la prima settimana di confezionamento della PEG.▪ ² Vedi in dettaglio procedura specifica ".....IN ELABORAZIONE"

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

PERINEO - ANTISEPSI

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none"> Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> Non previsto
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none"> Detergente intimo
ANTISETTICO	<ul style="list-style-type: none"> Iodopovidone 10% (Betadine soluzione) Ipoclorito di Sodio soluzione al 5% (= 50 ML di Amuchina + 950 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> 30 minuti
MODALITÀ	<p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none"> Non previsto <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none"> Abbondante detersione con detergente intimo ed acqua <p>Disinfezione</p> <ul style="list-style-type: none"> Con un tampone sterile imbevuto di soluzione antiseptico (Iodopovidone 10% - Betadine soluzione – Ipoclorito di sodio in soluzione al 5%) si effettua l'antisepsi della zona perineale eseguendo un movimento dall'alto al basso <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none"> Non previsto <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none"> Non previsto
NORME DI SICUREZZA	<p>IODOPOVIDONE</p> <ul style="list-style-type: none"> Evitare l'esposizione a fonti di calore Evitare l'uso contemporaneo con altri antisettici e/o detergenti Evitare l'uso prolungato per pazienti con problemi tiroidei Evitare l'uso prolungato sui bambini <p>IPOCLORITO DI SODIO</p> <ul style="list-style-type: none"> Prodotto concentrato: manipolare con guanti, mascherina + visiera Prodotto diluito: nessuna particolare precauzione
SMALTIMENTO	<p>IODOPOVIDONE - PRODOTTO CONCENTRATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rifiuto Speciale Raccogliere il liquido e smaltire secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>Alla luce del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamentazione recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" i disinfettanti scaduti o comunque da eliminare rientrano nella categoria "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO" e vanno smaltiti in taniche COLORATE (ES. "GIALLE") da 20 Lt con la dicitura R (vedi pag. 11)</p> <p>IPOCLORITO DI SODIO</p> <ul style="list-style-type: none"> Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I Prodotto diluito: Smaltire in rete fognaria
NOTE	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare i DPI adeguati alla manovra

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI
DISINFEZIONE

PERINEO - DETERSIONE

DECONTAMINANTE	▪ Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	▪ Non previsto
DETERGENTE	▪ Detergente intimo
ANTISETTICO	▪ Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	▪ Non previsto
MODALITÀ	<p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Non previsto <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Eseguire la detersione dei genitali "a caduta" con acqua e detergente intimo▪ Rimuovere eventuali residui di materiale organico dal punto di inserzione del catetere se è presente (tra catetere e meato urinario) <p>Disinfezione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Non previsto <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Asciugare tamponando con una salvietta <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Non previsto
NORME DI SICUREZZA	/
SMALTIMENTO	/
NOTE	<ul style="list-style-type: none">▪ In pazienti portatori di Catetere vescicale eseguire la detersione almeno 1 volta al giorno e dopo ogni evacuazione▪ Usare i DPI adeguati alla manovra

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

PREPARAZIONE PAZIENTE CHIRURGICO

DECONTAMINANTE	▪ Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	▪ Non previsto
DETERGENTE	▪ Personale del paziente o Saugella
ANTISETTICO	▪ Clorexidina 4% in soluzione saponosa (Hibiscrub) o Iodopovidone in soluzione saponosa al 10% (Betadine Chirurgico o Povi Iodine Scrub)
TEMPO DI CONTATTO	▪ 3 minuti
MODALITÀ	▪ Procedere come indicato: ⇒ effettuare risciacquo di viso e corpo ⇒ procedere al lavaggio in senso cranio – caudale con <u>soluzione detergente</u> e/o se indicato con soluzione saponosa di Clorexidina Gluconato 4% o Iodopovidone 10% ⇒ effettuare <ul style="list-style-type: none">▪ lavaggio dei capelli▪ pulizia del viso, naso e orecchie▪ lavaggio del tronco (attenzione a ascelle e inguine)▪ lavaggio della zona genitale e anale▪ lavaggio di gambe e piedi ⇒ procedere al risciacquo del corpo ⇒ asciugare tutte le parti con asciugamano pulito ⇒ indossare biancheria e indumenti puliti ⇒ asciugare i capelli con il phon
NORME DI SICUREZZA	ODOPOVIDONE <ul style="list-style-type: none">▪ Evitare l'esposizione a fonti di calore▪ Evitare l'uso contemporaneo con altri antisettici e/o detergenti▪ Evitare l'uso prolungato per pazienti con problemi tiroidei▪ Evitare l'uso prolungato sui bambini CLOREXIDINA <ul style="list-style-type: none">▪ Evitare il contatto con gli occhi
SMALTIMENTO	ODOPOVIDONE - PRODOTTO CONCENTRATO <ul style="list-style-type: none">▪ Rifiuto Speciale▪ Raccogliere il liquido e smaltire secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>Alla luce del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamentazione recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" i disinfettanti scaduti o comunque da eliminare rientrano nella categoria "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO" e vanno smaltiti in taniche COLORATE (ES. "GIALLE") da 20 Lt con la dicitura R (vedi pag. 11)</p> CLOREXIDINA Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I Prodotto diluito: Smaltire in rete fognaria
NOTE	▪ Vedi in dettaglio procedura specifica " LA PREPARAZIONE FISICA ALL'INTERVENTO CHIRURGICO 06.1/2004)" - www.pri-asl3to.it - ▪ Praticare la tricotomia della sola area d'intervento e nell'immediato preoperatorio con rasoio CLIPPER ▪ Rimuovere lo smalto dalle unghie, i monili e le protesi dentali mobili ▪ In caso di allergie documentate alla Clorexidina valutare la possibilità d'utilizzo di Iodopovidone al 10%

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

PIAGHE DA DECUBITO

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non previsto
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soluzione fisiologica
ANTISETTICO	<p><i>solo se lesione infetta</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IODOPOVIDONE 10% (Betadine soluzione) in soluzione, garze e pasta ▪ CLOREXIDINA in soluzione, garze ▪ ARGENTO CATADINICO ▪ IPOCLORITO DI SODIO *
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ /
MODALITÀ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indossare guanti di protezione <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Detergere la lesione con soluzione fisiologica sterile a temperatura ambiente esercitando una bassa pressione <p>Antisepsi (Per lesioni infette)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Con un tampone sterile imbevuto di Iodopovidone eseguendo un movimento rotatorio dal centro alla periferia
NORME DI SICUREZZA	<p>IODOPOVIDONE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evitare l'esposizione a fonti di calore ▪ Evitare l'uso contemporaneo con altri antisettici e/o detersivi ▪ Evitare l'uso prolungato per pazienti con problemi tiroidei ▪ Evitare l'uso prolungato sui bambini <p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evitare il contatto con gli occhi <p>IPOCLORITO DI SODIO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prodotto concentrato: manipolare con guanti, mascherina + visiera ▪ Prodotto diluito: nessuna particolare precauzione
SMALTIMENTO	<p>IODOPOVIDONE - PRODOTTO CONCENTRATO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rifiuto Speciale ▪ Raccogliere il liquido e smaltire secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>Alla luce del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamentazione recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" i disinfettanti scaduti o comunque da eliminare rientrano nella categoria "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO" e vanno smaltiti in taniche COLORATE (ES. "GIALLE") da 20 Lt con la dicitura R (vedi pag. 11)</p> <p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I ▪ Prodotto diluito: Smaltire in rete fognaria <p>IPOCLORITO DI SODIO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I ▪ Prodotto diluito al 5 – 10%: Smaltire in rete fognaria
NOTE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilizzare antibiotici ed antisettici topici solo in caso di indicazione clinica e/o medica ▪ Valutare attentamente <u>lo stadio della lesione.</u> ▪ Opportuno l'utilizzo di pomata a base di fibrinolisinasi e desossiribonucleasi per sciogliere o rimuovere i frammenti di tessuti necrotici. ▪ Prima e dopo la medicazione eseguire un lavaggio accurato delle mani. ▪ Utilizzare per l'irrigazione soluzioni tiepide poiché il freddo ritarda la guarigione ed una ferita può impiegare diverse ore a ritornare a temperatura ambiente dopo essere stata irrigata con una soluzione fredda. ▪ *Vedi in dettaglio protocollo aziendale "PROTOCOLLO SULLE LESIONI CUTANEE", 2003

**IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI
DISINFEZIONE**

RACCORDI - TAPPI IN GOMMA - PUNTI DI INIEZIONE SU GOMMINI

DECONTAMINANTE	▪ Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	▪ Non previsto
DETERGENTE	▪ Non previsto
DISINFETTANTE	▪ Clorexidina 0,5% in alcool (<u>Clorexin tintura</u>)
TEMPO DI CONTATTO	▪ 30 secondi almeno
MODALITÀ	<p><u>Decontaminazione</u></p> <p>▪ /</p> <p><u>Sanificazione</u></p> <p>▪ /</p> <p><u>Disinfezione</u></p> <p>▪ Trattare la superficie con un tampone di garza imbevuto di disinfettante</p> <p>▪ Strofinare energicamente</p> <p>▪ Lasciare agire per almeno 30 secondi</p> <p><u>Asciugatura</u></p> <p>▪ Non asciugare</p> <p><u>Conservazione</u></p> <p>▪ Non previsto</p>
NORME DI SICUREZZA	<p><u>CLOREXIDINA</u></p> <p>▪ Non necessarie precauzioni particolari</p>
SMALTIMENTO	<p><u>CLOREXIDINA</u></p> <p>▪ Smaltire in rete fognaria</p>
NOTE	<p>▪ Praticare lavaggio semplice della mani prima della manovra</p> <p>▪ Non lasciare immersi nella soluzione disinfettante garze o batuffoli</p> <p>▪ Non riutilizzare i tappi e non conservarli in immersione nel disinfettante.</p>

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3	Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale	Pag. 64 P.T. 01/07 REV. 01
--	---	---

**IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI
DISINFEZIONE**

SOFFIONI DOCCIA

Vedi scheda **frangiflussi n. 44**

SONDE ECOGRAFICHE LINEARI E VAGINALI

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none">Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">Non previsto
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none">Panno morbido imbevuto di acqua
DISINFETTANTE	<ul style="list-style-type: none">Clorexidina + Cetrimide in soluzione acquosa all'1% (=10 ML di Baxidin Concentrato + 990 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">/
MODALITÀ	<p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none">Non previsto <p>Sanificazione Tra un utente e l'altra ed a fine seduta</p> <ul style="list-style-type: none">Panno monousoAcqua <p>Disinfezione a fine seduta</p> <ul style="list-style-type: none">Trattare delicatamente con un panno monouso e/o garza pulita imbevuta soluzione acquosa all'1% di Clorexidina + Cetrimide (= 10 ML di Baxidin Concentrato + 990 ML di acqua) <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">Asciugare con garza pulita <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">In apposito contenitore
NORME DI SICUREZZA	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">Evitare il contatto con gli occhimanipolare con i guanti
SMALTIMENTO	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-IProdotto diluito: Smaltire in rete fognaria
NOTE	<ul style="list-style-type: none">Detergere dopo ogni uso, per eliminare ogni traccia di gelLa sonda ecografia vaginale tra i diversi usi deve essere coperta con coprisonda monouso o con guanto monouso non sterile in VINILE o in LATTICECambiare il coprisonda e/o il guanto ad ogni paziente

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI
DISINFEZIONE

STOMIE – DETERSIONE DELLA CUTE PERISTOMALE

DECONTAMINANTE	▪ Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	▪ Non previsto
DETERGENTE	▪ Detergente liquido tipo Saugella
ANTISETTICO	▪ Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	▪ Non previsto
MODALITÀ	<ul style="list-style-type: none">▪ Indossare guanti <u>non</u> sterili▪ Rimuovere il sacchetto e la placca staccando dall'alto verso il basso, tendendo ed umidificando la cute peristomale <p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Non previsto <p>Sanificazione /Detersione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Detergere l'epidermide intorno alla stomia con acqua potabile tiepida e Saugella effettuando movimenti circolari dall'esterno verso la stomia (evitare contatto istolesivo delle feci con la cute) <p>Disinfezione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Non previsto <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Con garza <u>non</u> sterile▪ Riposizionare un nuovo sacchetto <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Non previsto
NORME DI SICUREZZA	▪ Nessuna particolare precauzione
SMALTIMENTO	▪ Nessuna particolare precauzione
NOTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Utilizzare gli adeguati DPI (guanti non sterili)▪ La placca non deve essere rinnovata ad ogni cambio di sacchetto▪ <u>La disinfezione della zona</u> della stomia deve essere effettuata solo se insorgono complicanze infettive.

STRUMENTI CHIRURGICI (DECONTAMINAZIONE) LAVAGGIO MANUALE

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none">Polifenoli in soluzione acquosa all'1% (= 10 ML di Fenplus HWP + 990 ML di acqua) in bustine monodose o fiasco da 5 LT
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">30 minuti per i Polifenoli (FENPLUS HWP)
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none">Detergente enzimatico (Proteozim plus 25 ML + 975 ml di acqua)Tempo di contatto 10 minuti per immersione
DISINFETTANTE	<ul style="list-style-type: none">Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">Non previsto
MODALITÀ	<ul style="list-style-type: none">Indossare i DPI per le manovre di pulizia e decontaminazione dello strumentario <p>Decontaminazione per almeno 30 minuti</p> <ul style="list-style-type: none">Soluzione di Polifenoli in soluzione acquosa all'1% (= 10 ML di Fenplus HWP + 990 ML di acqua) <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none">in presenza di abbondanti quantità di materiale organico immergere in una soluzione di detergente enzimatico per almeno 10 minuti (immergere le pinze aperte)rimuovere i residui di materiale con l'ausilio di spazzolini o scovolinisciappare sotto acqua corrente <p>Disinfezione</p> <ul style="list-style-type: none">Non previsto <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">Asciugare con panni puliti o con aria compressa <p>Lubrificazione (se indicata)</p> <ul style="list-style-type: none">Immergere gli strumenti aperti nell'apposito latte per almeno 30 secondiRiporli su panno pulitoAsciugare con un o panno pulito o con aria compressaAvviare al processo di sterilizzazione
NORME DI SICUREZZA	<p>POLIFENOLI</p> <ul style="list-style-type: none">Evitare contatto con occhi e cuteIndossare occhiali, guanti e camici protettiviProteggere dalle alte temperatureNon respirare i vapori; utilizzare contenitori chiusi
SMALTIMENTO	<p>POLIFENOLI - PRODOTTO CONCENTRATO</p> <ul style="list-style-type: none">Rifiuto Speciale PericolosoRaccogliere il liquido e smaltire come rifiuto Tossico Speciale Pericoloso secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>POLIFENOLI - PRODOTTO DILUITO a concentrazione < 1%</p> <ul style="list-style-type: none">Rifiuto Speciale. Raccogliere il liquido e smaltire secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>Alla luce del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamentazione recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" i disinfettanti scaduti o comunque da eliminare rientrano nella categoria "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO" e vanno smaltiti in taniche COLORATE (ES. "GIALLE") da 20 Lt con la dicitura R (vedi pag. 11)</p>
NOTE	<ul style="list-style-type: none">Utilizzare i DPI necessari e lavare le mani dopo aver rimosso i guantiPreferire processo meccanizzato (macchina lavaferri) alla procedura manualeRiporre gli strumenti decontaminati e sanificati in appositi contenitori (buste o container) ed inviare alla sterilizzazione.I contenitori adibiti alla decontaminazione, lavaggio e lubrificazione dello strumentario chirurgico (bacinelle, vassoi,) devono essere impiegati esclusivamente a questo scopo e vanno trattati come da scheda n. 35 CONTENITORI PLURIUSO/DISPENSER RIUTILIZZABILI/SPAZZOLINI, SCVOLINITrattare i ferri nuovi come indicato nei punti Sanificazione, Asciugatura, Lubrificazione prima di inviarli alla sterilizzazioneRinnovare la soluzione decontaminante in uso ogni 24 ore, ed ogni qualvolta sia visibilmente contaminata da materiale organicoLa soluzione predisposta in tanica adeguata è stabile per 7 gg

STRUMENTI CHIRURGICI, lavaggio automatizzato

DECONTAMINANTE	▪ Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	▪ Non previsto
DETERGENTE	▪ Non previsto
DISINFETTANTE	▪ Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	▪ Non previsto
MODALITÀ	<ul style="list-style-type: none">▪ Indossare camice protettivo, occhiali o visiera di protezione, mascherina chirurgica e guanti di gomma di tipo domestico.▪ Suddividere gli strumenti per tipo di sporco, per tipo di strumento (plastica, metallo, vetro ecc.) e per metodologia di lavaggio che s'intende utilizzare.▪ Smontare gli strumenti scomponibili e disporli sulle griglie in ordine logico per facilitarne la ricomposizione▪ Disporre gli strumenti in modo tale che tutti vengano a contatto con i getti d'acqua prodotti dalla lavatrice (porre i presidi cavi con l'apertura rivolta verso il basso)▪ Porre gli strumenti in lavatrice collocando insieme quelli più alti da una parte della macchina, e quelli più piccoli in cesti e vassoi▪ Non posizionare gli strumenti troppo vicini l'uno all'altro▪ Lasciare spazio a sufficienza tra la porta della macchina ed i cestelli interni
NORME DI SICUREZZA	/
SMALTIMENTO	/
NOTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Se gli strumenti non possono essere lavati in tempi brevi, porli in soluzione enzimatica per evitare la formazione di incrostazioni.▪ Utilizzare i DPI necessari per la protezione dell'operatore

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

STRUMENTI PER IL RISCONTRO AUTOPTICO

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Polifenoli in soluzione acquosa all'1% (= 50 ML di Fenplus HWP + 4950 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">▪ 30 minuti
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Detergente enzimatico (Proteozim plus 25 ml + 975 ml di acqua);▪ Tempo di contatto 10 minuti per immersione
DISINFETTANTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Polifenoli in soluzione acquosa all'1% (= 50 ML di Fenplus HWP + 4950 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">▪ 30 minuti per i Polifenoli
MODALITÀ	<ul style="list-style-type: none">▪ Indossare i DPI per le manovre di pulizia e decontaminazione dello strumentario <p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Immergere <u>immediatamente</u> e per almeno 30 minuti in soluzione di polifenoli all'1% (= 50 ML di Fenplus HWP + 4950 ML di acqua) gli strumenti utilizzati <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Immergere successivamente in soluzione di detergente enzimatico per almeno 10 minuti (le pinze devono essere aperte prima dell'immersione)▪ Rimuovere i residui di materiale con l'ausilio di spazzolini o scovolini▪ Sciacquare sotto acqua corrente <p>Disinfezione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Immergere gli strumenti in nuova Soluzione di polifenoli all'1% (= 50 ML di Fenplus HWP + 4950 ML di acqua) per almeno 30 minuti <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Asciugare con panni puliti o con aria compressa <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Conservare protetti in luogo asciutto e pulito
NORME DI SICUREZZA	<p>POLIFENOLI</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Evitare contatto con occhi e cute▪ Indossare occhiali, guanti e camici protettivi▪ Proteggere dalle alte temperature▪ Non respirare i vapori: utilizzare contenitori chiusi
SMALTIMENTO	<p>POLIFENOLI - PRODOTTO CONCENTRATO</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Rifiuto Speciale Pericoloso▪ Raccogliere il liquido e smaltire come rifiuto Tossico Speciale Pericoloso secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>POLIFENOLI - PRODOTTO DILUITO a concentrazione < 1%</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Rifiuto Speciale. Raccogliere il liquido e smaltire secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>Alla luce del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamentazione recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" i disinfettanti scaduti o comunque da eliminare rientrano nella categoria "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO" e vanno smaltiti in taniche COLORATE (ES. "GIALLE") da 20 Lt con la dicitura R (vedi pag. 11)</p>
NOTE	<ul style="list-style-type: none">▪ E' preferibile l'adozione di materiale monouso.▪ Utilizzare i DPI necessari per la protezione dell'operatore▪ Lavare le mani dopo aver rimosso i guanti▪ I contenitori adibiti alla decontaminazione, lavaggio e lubrificazione dello strumentario autoptico (bacinelle, vassoi,...) devono essere impiegati esclusivamente a questo scopo e trattati come da scheda n. 35 CONTENITORI PLURIUSO/DISPENSER RIUTILIZZABILI/SPAZZOLINI, SCOVOLINI▪ Rinnovare la soluzione decontaminante, enzimatica, disinfettante dopo ogni intervento autoptico▪ Vedi in dettaglio Procedura specifica "PROCEDURA ASSISTENZIALI DURANTE IL RISCONTRO AUTOPTICO" ASL 3, 2003 - www.pri-asl3to.it -▪ Tenere separate le soluzioni da destinare alla decontaminazione ed alla disinfezione

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

STRUMENTI UTILIZZATI SU PAZIENTE CON SOSPETTA CJ

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Irossido di Sodio (NaOH) 1 N (40 gr per litro) ▪ Dicloroisocianurato 2% (= 8 CPR di BIONIL da 4,6 gr, + 1000 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30 minuti in immersione ed in autoclave si utilizza NaOH a 121° C ▪ 60 minuti in immersione a temperatura ambiente se si utilizza Ipoclorito di sodio
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Detergente enzimatico (Proteozim plus 25 ml + acqua 975 ml); ▪ Tempo di contatto: 10 minuti per immersione
DISINFETTANTE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ /
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ /
MODALITÀ	<p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Immersione in Irossido di Sodio (NaOH) 1 N (40 gr per litro) ▪ Porre in autoclave a 121° C per oltre 30 minuti ▪ Pulire, risciacquare, e sottoporre alla consueta sterilizzazione <p>Oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Immersione in NaOH 1 N o in alternativa in Dicloroisocianurato 2% (= 8 CPR di BIONIL da 4,6 gr, + 1000 ML di acqua) per 1 ora. ▪ Rimuovere gli strumenti dalla soluzione ed autoclavare a 134° C per un tempo uguale o maggiore di 30 minuti. <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Immergere in soluzione di detergente enzimatico per almeno 10 minuti (le pinze devono essere aperte prima dell'immersione) ▪ Rimuovere i residui di materiale con l'ausilio di spazzolini o scovolini ▪ Sciacquare sotto acqua corrente <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Asciugare con panni puliti o con aria compressa <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Avviare alla sterilizzazione
NORME DI SICUREZZA	<p>DICLOROISOCIANURATO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evitare il contatto con gli occhi ▪ Conservare in luogo asciutto fresco e ventilato ▪ Non toccare il prodotto con le mani; usare guanti di protezione ▪ Non aspirare i fumi una volta applicato (granuli); ventilare l'ambiente <p>IDROSSIDO DI SODIO 1N</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare i comuni DPI
SMALTIMENTO	<p>DICLOROISOCIANURATO. PRODOTTO CONCENTRATO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rifiuto Pericoloso ▪ Raccogliere il liquido e smaltire secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>IDROSSIDO DI SODIO 1N</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nessuna precauzione particolare
NOTE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non utilizzare apparecchiature lavastrumenti se prima non si è proceduto alla decontaminazione dello strumentario, come sopra indicato. ▪ Eseguire un ciclo a vuoto prima del riuso dell'apparecchiatura lavastrumenti. ▪ Se possibile, prediligere l'uso di guaine protettive monouso su strumentario non termolabile ▪ Attenersi alle indicazioni del produttore per il trattamento di strumenti dotati di lenti. ▪ Le soluzioni disinfettanti utilizzate per la decontaminazione devono essere smaltite come rifiuto speciale pericoloso a rischio infettivo (CLINICAL BOX) ▪ Manipolare aghi e taglienti con doppio paio di guanti, visor e filtrante facciale (FFP1) ▪ Vedi in dettaglio procedura specifica: "PAZIENTE AFFETTO DA ENCEFALOPATIA SPONGIFORME: ASPETTI GESTIONALI P.O. 04/04" - www.pri-asl3to.it -

STRUMENTI ENDOSCOPICI (Gastroscopi, Colonscopi, Broncoscopi,...) LAVAGGIO MANUALE E DISINFEZIONE

DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Detergente enzimatico (Proteozim plus)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">▪ 10 minuti
DISINFETTANTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Glutaraldeide al 2% (Cidex),▪ Acido peracetico 35 - 40% (Steris Sistem)▪ Elettrolisi acida
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">▪ 10 minuti per il Detergente enzimatico (Proteozim Plus)▪ 3 ore per la Glutaraldeide al 2% (Cidex)▪ 30 minuti per l'Acido peracetico (Steris Sistem)▪ 7 minuti per Elettrolisi acida
MODALITÀ	<p>A) LAVAGGIO dello strumento</p> <ul style="list-style-type: none">▪ indossare i DPI adeguati (camice monouso, mascherina, occhiali o visiera, guanti)▪ effettuare il test di verifica dell'impermeabilità della guaina dell'endoscopio (se non previsto dalla lavaendoscopi)▪ immediatamente dopo l'uso, lo strumento deve essere <u>sottoposto a lavaggio preliminare</u> per rimuovere la gran parte dei residui organici (trattare la superficie esterna con una garza imbevuta di detergente enzimatico con una siringa da 50 ML riempita di soluzione enzimatica effettuare almeno 5 o 6 lavaggi dei canali)▪ rimuovere tutte le valvole ed immergerle nel detergente enzimatico; riempire i canali dello strumento con una siringa da 50 ML riempita di soluzione enzimatica; immergere totalmente lo strumento nella medesima soluzione per almeno 10 minuti▪ estrarre lo strumento e procedere alla pulizia esterna con l'ausilio di garze e spazzolini + soluzione enzimatica; effettuare la stessa procedura sulle valvole▪ effettuare la pulizia del canale di aspirazione/canale bioptico utilizzando apposito scovolino (effettuare almeno tre passaggi) avendo cura di sciacquare lo scovolino all'uscita del canale e prima di ritirarlo (per evitare contaminazioni retrograde)▪ se non si utilizza la macchina lavaendoscopi, effettuare il risciacquo dello strumento utilizzando acqua deionizzata sulla superficie e nei canali interni▪ procedere con l'asciugatura dei canali (insufflare/aspirare aria per almeno 30 secondi) e delle parti esterne (con telino pulito) <p>B) DISINFEZIONE dello strumento</p> <p>B1. Automatizzata con GLUTARALDEIDE (consigliata rispetto a quella manuale):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ inserire lo strumento nella macchina lava-disinfetta endoscopi▪ effettuare i collegamenti per l'irrigazione dei canali▪ avviare la macchina▪ controllare se è prevista una fase di risciacquo e di asciugatura se questa non fosse contemplata procedere come al punto c. <p>B2. Disinfezione manuale con GLUTARALDEIDE (se impossibile quella automatizzata)</p> <ul style="list-style-type: none">▪ predisporre un contenitore pulito e disinfettato, sufficientemente capiente, e riempirlo di glutaraldeide al 2% (Cidex)▪ riempire i canali dello strumento con la soluzione disinfettante▪ immergere totalmente lo strumento nella soluzione, le valvole e le parti rimovibili chiudere ermeticamente il contenitore▪ Mantenere lo strumento in immersione per almeno 30 minuti per ottenere disinfezione ad alto livello e per almeno 3 ore per ottenere sterilizzazione a freddo.

MODALITA' (segue)

B3. Disinfezione con sistema Steris Sistem

- Inserire lo strumento nell'apposito vassoio seguendo le indicazioni del produttore, in particolare per la connessione dei canali interni che devono entrare a contatto con la sostanza sterilizzante
- Predisporre l'apparecchiatura con la cartuccia disinfettante
- Attivare il ciclo di sterilizzazione seguendo le indicazioni della Ditta Steris
- Attendere il completamento del ciclo (30 minuti)

B4. Disinfezione con sistema Elettrolisi acida

- Predisporre l'apparecchiatura con il carico di acqua fredda e l'aggiunta di sale nell'apposita vasca
- Avviare il processo di acidificazione dell'acqua
- Inserire lo strumento nell'apposito cestello connettendo i canali l'adattatore del test di tenuta
- Avviare l'apparecchio registrando (prima o durante il ciclo) i dati dello strumento nella stampante
- Attendere il completamento del ciclo (7 minuti)
- Al termine della disinfezione asciugare la superficie esterna ed interna dello strumento con aria compressa
- Dopo 20 cicli di disinfezione avviene lo scarico automatico dell'acqua, mentre è necessario ricordarsi di stampare il report dei cicli avvenuti

C) RISCIAQUO ED ASCIUGATURA da prevedere se utilizzato sistema di disinfezione B2 o B1 senza risciacquo

- Utilizzare guanti puliti, rimuovere lo strumento dalla soluzione disinfettante ed immergerlo in una bacinella contenente acqua deionizzata
- Risciacquare abbondantemente lo strumento sia internamente sia esternamente.
- L'asciugatura deve essere eseguita in maniera meticolosa, soprattutto all'interno dei canali con teli puliti e l'insufflazione di aria (è consigliato l'utilizzo di aria compressa).

D) CONSERVAZIONE degli strumenti

- Alloggiare gli strumenti nell'apposito armadio in posizione verticale, oppure nelle cassette dedicate, protetti da polvere, luce e fonti di calore diretto

NORME DI SICUREZZA

GLUTARALDEIDE

- Aerare i locali dove il prodotto è stoccato o manipolato (Utilizzare le cappe aspiranti)
- Usare mascherina con filtro (FFPP1)
- Proteggere le mani con guanti protettivi
- Usare occhiali di sicurezza
- Indossare indumenti di protezione per la cute (camice con rinforzo + maniche lunghe)

ACIDO PERACETICO

- Conservare in posizione verticale, in luogo fresco, asciutto e ventilato
- Estrarre la cartuccia dal suo involucro immediatamente prima dell'uso
- Manipolare con attenzione senza danneggiare il contenitore
- Proteggere le mani con guanti protettivi (gomma o neoprene)
- Usare occhiali di sicurezza
- Indossare indumenti di protezione per la cute (camice con rinforzo + maniche lunghe)
- Non miscelare con ipocloriti

ACQUA ACIDA

- Nessuna precauzione

SMALTIMENTO

GLUTARALDEIDE – PRODOTTO CONCENTRATO

- Rifiuto Pericoloso
- Raccogliere il liquido e smaltire come rifiuto Tossico Nocivo secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione)

Alla luce del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamentazione recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" i disinfettanti scaduti o comunque da eliminare rientrano nella categoria "**RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO**" e vanno smaltiti in **taniche COLORATE (ES. "GIALLE") da 20 Lt con la dicitura R (vedi pag. 11)**

ACIDO PERACETICO

- **Prodotto diluito:** in rete fognaria
- **Prodotto concentrato:** diluire il prodotto in 20 parti di acqua

ACQUA ACIDA

- In rete fognaria

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

NOTE

- Se possibile inviare alla sterilizzazione, dopo la fase di pulizia (**punto A.**) endoscopi ed accessori autoclavabile
- Nessun tipo di accessorio monouso deve essere risterilizzato.
- Eseguire in zone separate le fasi di pulizia (locale sporco) e di disinfezione degli strumenti (locale pulito)
- Attendere il completamento di tutti i cicli prima di riutilizzare lo strumento
- Mantenere il disinfettante a contatto con lo strumento per un tempo adeguato (utilizzando la glutaraldeide: se si vuole ottenere una disinfezione ad alto livello = **minimo 30 minuti** se occorre la sterilizzazione a freddo = **minimo 3 ore**)
- Sostituire la glutaraldeide almeno dopo 20 cicli di disinfezione
- Controllare che l'endoscopio sia immerso completamente nella soluzione disinfettante
- Riprocessare, prima dell'uso, seguendo le metodiche **B1** o **B2** o **B3** o **B4**, gli strumenti endoscopici per i quali è necessaria la sterilità prima del riuso
- Il materiale utilizzato per il reprocessing dello strumento (scovolini, spazzolini, ecc.) deve essere sottoposto a ciclo di disinfezione

SUPERFICI dei locali ad alto rischio

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none"> In caso di versamento di materiale organico, vedi scheda n. 88 "<u>VERSAMENTO ACCIDENTALE DI MATERIALE BIOLOGICO</u>"
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> vedi scheda n. 88 "<u>VERSAMENTO ACCIDENTALE DI MATERIALE BIOLOGICO</u>"
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none"> Detergente liquido per pavimenti
DISINFETTANTE	<ul style="list-style-type: none"> Clorossidante 5% (= 500 ml di ANTISAPRIL + 9500 ml di acqua) Dicloroisocianurato 0,1% (= 4 CPR di BIONIL da 4,6 + 10 LT di acqua) Clorexidina + Cetrimide in soluzione all'1% (= 100 ML di BAXIDIN Concentrato + 9900 ML di acqua) Ipoclorito di sodio (= 20 ml di Conegrina + 980 ml di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> 30 minuti per contatto
MODALITA'	<p>Intervento di Base</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>aerare</u> il locale evitando correnti moleste (se non presente impianto di condizionamento) <u>svuotare</u> i cestini porta-rifiuti e <u>pulire, se necessario</u>, il contenitore (eventuale <u>sostituzione</u> del sacchetto) <u>trasportare</u> i rifiuti al punto di raccolta <u>detergere e disinfettare*</u> il lavabo i rubinetti e l'area lavabo (se presente nel locale) <u>spolverare ad umido</u> e rimuovere le macchie da <u>tutte</u> le superfici orizzontali e verticali accessibili senza l'uso di scala (comodini, letti, armadi, tavoli, sedie, aste flebo, tavolini, arredi in genere, piani di lavoro, telefoni, punti luce, plafoniere, suppellettili, davanzali interni, elementi di riscaldamento, porte, sportelli, maniglie, interruttori, specchi, pulsantiere, corrimano, mensole, ecc...) <u>disinfettare*</u> le superfici orizzontali e verticali sopra elencate con il prodotto prescelto <u>detergere</u> i servizi igienici secondo la seguente sequenza: vetri, specchi, cristalli, maniglie, accessori (portasapone, porta-asciugamani, porta-copriwc,...), rubinetterie, lavandini, vasche da bagno, docce, bidet, wc, vuotatoi, scopino wc, ecc.. <u>disinfettare*</u> i servizi igienici secondo la sequenza sopra descritta, senza asciugare <u>rifornire i dispenser</u> (carta igienica, sapone liquido, carta asciugamani, copriwc forniti dall'asl) <u>scopare ad umido</u> i pavimenti <u>detergere</u> i pavimenti <u>disinfettare*</u> i pavimenti <u>riordinare il locale</u> (sedie sul pavimento, arredi nella posizione originaria, ecc.) <u>segnalare al committente eventuali anomalie</u> (luci, tapparelle, serrature malfunzionanti, presenza parassiti, ecc..) <p>Intervento di ripasso</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>svuotare</u> i cestini porta-rifiuti <u>spolverare ad umido</u> e rimuovere le macchie da tutte le superfici orizzontali e verticali accessibili senza l'uso di scala <u>scopare ad umido</u> i pavimenti <u>detergere i servizi igienici</u> secondo la seguente sequenza: vetri, specchi, cristalli, maniglie, accessori (portasapone, porta- asciugamani, porta-copriwc,...), rubinetterie, lavandini, vasche da bagno, docce, bidet, wc, vuotatoi , scopino wc <u>disinfettare*</u> i servizi igienici secondo la sequenza sopra descritta, senza asciugatura <u>rifornire i dispenser</u> (carta igienica, sapone liquido, carta asciugamani, copriwc, <u>forniti dall'asl</u>) <u>detergere i pavimenti</u> <u>disinfettare i pavimenti *</u> <u>riordinare il locale</u>

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

MODALITA'	<p><u>Intervento a vista</u></p> <ol style="list-style-type: none">1) <u>rimuovere</u> le ragnatele2) <u>detergere</u> cestini portarifiuti3) <u>rimuovere</u> le orme da vetri e cristalli, porte e maniglie4) <u>disincrostare</u> la rubinetteria, lavandini, vasche, docce, vuotatoi, wc5) <u>detergere/disinfettare*</u> ogni superficie in presenza di sporco evidente
NORME DI SICUREZZA	<p><u>DICLOROISOCIANURATO</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Evitare il contatto con gli occhi▪ Conservare in luogo asciutto fresco e ventilato▪ Non toccare il prodotto con le mani; usare guanti di protezione▪ Non aspirare i fumi una volta applicato (granuli); ventilare l'ambiente <p><u>CLOROSSIDANTE/IPOCLORITO</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ <u>Prodotto concentrato:</u> manipolare con guanti, mascherine + visiera▪ <u>Prodotto diluito:</u> Nessuna particolare precauzione <p><u>CLOREXIDINA</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Evitare il contatto con gli occhi.▪ Utilizzare guanti protettivi
SMALTIMENTO	<p><u>DICLOROISOCIANURATO. PRODOTTO CONCENTRATO:</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Rifiuto Pericoloso▪ Raccogliere il liquido e smaltire come rifiuto Tossico Nocivo secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>Alla luce del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamentazione recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" i disinfettanti scaduti o comunque da eliminare rientrano nella categoria "<u>RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO</u>" e vanno smaltiti in <u>taniche COLORATE (ES. "GIALLE") da 20 Lt con la dicitura R (vedi pag. 11)</u></p> <p><u>CLOROSSIDANTE/IPOCLORITO</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ <u>Prodotto diluito al 5 – 10 %:</u> smaltire in rete fognaria▪ <u>Prodotto concentrato:</u> Smaltire nel contenitore per <u>RSP-I</u> (CLINICAL BOX) <p><u>CLOREXIDINA</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ <u>Prodotto diluito:</u> Smaltire in rete fognaria▪ <u>Prodotto concentrato:</u> Smaltire nel contenitore per <u>RSP-I</u> (CLINICAL BOX)
NOTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Tenere separate le attrezzature per il trattamento dei servizi igienici▪ Il personale che esegue la pulizia terminale deve adottare le stesse precauzioni e le stesse misure di barriera utilizzate quando il malato era presente nella stanza (es. uso di mascherina durante la pulizia terminale dell'unità se il soggetto ricoverato in quella stanza era in regime di isolamento respiratorio).▪ Partire dalle aree meno contaminate verso quella più contaminate oppure utilizzare materiale monouso▪ Se si utilizza il sistema MOP (doppio secchio e strizzatore) procedere come segue:<ol style="list-style-type: none">a) riempire un secchio di acqua e detergente (o disinfettante), l'altro con acquab) bagnare lo straccio o il fiocco lavapavimenti nel secchio contenente il detergente (o il disinfettante) e strizzarlo leggermentec) pulire la superficie del pavimento effettuando, con il fiocco, un movimento "a zigzag", senza ripassare sulla zona precedentemente trattatad) sciacquare lo straccio o il fiocco nell'acqua del secondo secchio prima di immergerlo nuovamente nella soluzione detergente. <p>VEDI IN DETTAGLIO ALLEGATO N. 4 "SUDDIVISIONE DELL'OSPEDALE IN AREE A DIVERSO GRADO DI RISCHIO"</p>

SUPERFICI dei locali ad alto rischio – Sala settoria

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none"> In caso di versamento di materiale organico, vedi scheda n. 88 "<u>VERSAMENTO ACCIDENTALE DI MATERIALE BIOLOGICO</u>".
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> 10 Minuti
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none"> detergente liquido per pavimenti
DISINFETTANTE	<ul style="list-style-type: none"> Ipoclorito di sodio (= 1 LT di Conegrina + 9 LT di acqua) Clorossidante 5% (= 500 ml di ANTISAPRIL + 9500 ml di acqua) Dicloroisocianurato 0,5% (= 2CPR di BIONIL da 4,6 + 1 LT di acqua) Clorexidina + Cetrimide in soluzione all'1% (= 100 ML di BAXIDIN Concentrato + 9900 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> 30 minuti
MODALITÀ	<ul style="list-style-type: none"> Indossare i DPI <p>Al termine del riscontro autoptico</p> <p>Tavolo settorio: rimuovere i grossi residui di materiale organico con l'ausilio di acqua (es. Tramite doccia) e materiale a perdere (es. Panno carta). Effettuare la detersione del tavolo con acqua e soluzione detergente asciugare con panno pulito effettuare la disinfezione con una soluzione di clorexidina + cetrimide all'1% (= 100 ml di baxidin concentrato + 9900 ml di acqua) erogata tramite spruzzatore o utilizzando un panno imbevuto di tale soluzione lasciare asciugare.</p> <p>Pavimento: rimuovere i grossi residui di materiale organico tramite panno carta o altro materiale a perdere lavare il pavimento di tutta la sala con acqua e detergente lasciare asciugare ripassare con una soluzione di acqua e Ipoclorito di sodio (= 1 LT di Conegrina + 9 LT di acqua)</p> <p>Strumenti: vedi scheda specifica PAG. 69 "STRUMENTI PER RISCONTRO AUTOPTICO"</p>
NORME DI SICUREZZA	<p>DICLOROISOCIANURATO</p> <ul style="list-style-type: none"> Evitare il contatto con gli occhi Conservare in luogo asciutto fresco e ventilato Non toccare il prodotto con le mani; usare guanti di protezione Non aspirare i fumi una volta applicato (granuli); ventilare l'ambiente <p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none"> Evitare il contatto con gli occhi manipolare con i guanti <p>CLOROSSIDANTE/IPOCLORITO</p> <ul style="list-style-type: none"> Prodotto concentrato: manipolare con guanti, mascherina + visiera Prodotto diluito: nessuna particolare precauzione
SMALTIMENTO	<p>DICLOROISOCIANURATO. PRODOTTO CONCENTRATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rifiuto Pericoloso Raccogliere il liquido e smaltire come rifiuto Tossico Nocivo secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>Alla luce del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamentazione recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" i disinfettanti scaduti o comunque da eliminare rientrano nella categoria "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO" e vanno smaltiti in taniche COLORATE (ES. "GIALLE") da 20 Lt con la dicitura R (vedi pag. 11)</p> <p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none"> Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I Prodotto diluito: Smaltire in rete fognaria <p>CLOROSSIDANTE/IPOCLORITO</p> <ul style="list-style-type: none"> Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I Prodotto diluito: Smaltire in rete fognaria
NOTE	<p>Se si utilizza il sistema mop (doppio secchio e strizzatore) procedere come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> riempire un secchio di acqua fredda e disinfettante, l'altro solo con acqua bagnare lo straccio o il fiocco lavapavimenti nel secchio contenente il disinfettante e strizzarlo leggermente disinfettare la superficie del pavimento effettuando, con il fiocco, un movimento "a zigzag", senza ripassare sulla zona precedentemente trattata sciappare lo straccio o il fiocco nell'acqua del secondo secchio prima di immergerlo nuovamente nella soluzione disinfettante Tenere separate le attrezzature per il trattamento dei servizi igienici Vedi in dettaglio procedura specifica: "PROCEDURE ASSISTENZIALI DURANTE IL RISCONTRO AUTOPTICO", ASL 3 2003 - www.pri-asl3to.it -

SUPERFICI del locale autoptico per paziente con CJ – Sala settoria

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none">▪ I drossido di Sodio (NaOH) 2N (80 gr/lt)▪ Dicloroisocianurato 2% (= 8 cpr di BIONIL da 4,6 gr + 1 LT di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">▪ 60 minuti
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none">▪ detergente liquido per pavimenti
DISINFETTANTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Dicloroisocianurato 0,5% (=2 CPR di BIONIL da 4,6 gr + 1000 ML di acqua)▪ Clorexidina + Cetrimide all'1% (=100 ML di BAXIDIN Concentrato + 9900 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">▪ 30 minuti
MODALITÀ	<p>Decontaminazione (tavolo settorio, piccole superfici)</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Coprire il tavolo settorio con telo in TNT o lenzuolino copribarella,▪ Cospargere con soluzione di DICLOROISOCIANURATO 2% (= 8 CPR di BIONIL da 4,6 gr + 1000 ML di acqua) o NaOH 2N (80 gr/lt)▪ Lasciare in posa per 1 ora▪ Assorbire <p>Sanificazione/Disinfezione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Sciacquare con acqua▪ Disinfettare le superfici con Clorexidina + Cetrimide all'1% (= 100 ML di BAXIDIN Concentrato + 9900 ML di acqua) <p>Decontaminazione grandi superfici:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Cospargere con soluzione di DICLOROISOCIANURATO 2% (= 8 CPR di BIONIL da 4,6 gr + 1000 ML di acqua)▪ Lasciare in posa per 1 ora▪ Assorbire con MOP <p>Sanificazione/Disinfezione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Sciacquare con acqua▪ Sanificare con detergente per pavimenti▪ Disinfettare con soluzione di Dicloroisocianurato 0,5% (= 2 CPR di BIONIL da 4,6 gr + 1000 ML di acqua)
NORME DI SICUREZZA	<p>DICLOROISOCIANURATO</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Evitare il contatto con gli occhi▪ Conservare in luogo asciutto fresco e ventilato▪ Non toccare il prodotto con le mani; usare guanti di protezione▪ Non aspirare i fumi una volta applicato (granuli); ventilare l'ambiente <p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Evitare il contatto con gli occhi▪ manipolare con i guanti <p>IDROSSIDO DI SODIO</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Usare i comuni DPI
SMALTIMENTO	<p>DICLOROISOCIANURATO. PRODOTTO CONCENTRATO:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Rifiuto Pericoloso▪ Raccogliere il liquido e smaltire come rifiuto Tossico Nocivo secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>Alla luce del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamentazione recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" i disinfettanti scaduti o comunque da eliminare rientrano nella categoria "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO" e vanno smaltiti in taniche COLORATE (ES. "GIALLE") da 20 Lt con la dicitura R (vedi pag. 11)</p> <p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I▪ Prodotto diluito: Smaltire in rete fognaria <p>IDROSSIDO DI SODIO</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Nessuna precauzione particolare

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3	Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale	Pag. 78 P.T. 01/07 REV. 01
--	---	---

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

NOTE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prediligere il ricorso a materiale monouso ▪ Incenerire il materiale non monouso utilizzato per le pulizie (es. stracci, mop, ecc). ▪ Vedi in dettaglio procedura specifica: "PAZIENTE AFFETTO DA ENCEFALOPATIA SPONGIFORME: ASPETTI GESTIONALI" SETTEMBRE 2004 - www.pri-asl3to.it -
-------------	---

SUPERFICI dei locali a medio rischio

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none"> In caso di versamento di materiale organico, vedi scheda n. 88 "VERSAMENTO ACCIDENTALE DI MATERIALE BIOLOGICO"
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> 10 Minuti
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none"> Detergente liquido per pavimenti
DISINFETTANTE	<ul style="list-style-type: none"> Antisapril 2% (= 200 ml di ANTISAPRIL + 9800 ml di acqua) Dicloroisocianurato 0,1% (= 2 CPR di BIONIL da 4,6 + 5 LT di acqua) Clorexidina + Cetrimide all'1% (=100 ML di BAXIDIN Concentrato + 9900 ML di acqua) Ipoclorito di sodio (= 10 ML di Conegrina + 990 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> 30 minuti
MODALITÀ	<p>Intervento di Base</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>Aerare</u> il locale evitando correnti moleste <u>Svuotare</u> i cestini porta-rifiuti, e pulire, se necessario, il contenitore (<i>eventuale sostituzione</i> del sacchetto) <u>Trasportare</u> i rifiuti al punto di raccolta <u>Detergere e disinfettare*</u> il lavabo, i rubinetti e l'area lavabo (se presente nel locale) <u>Spolverare ad umido</u> e <u>rimuovere</u> le macchie da <u>tutte</u> le superfici orizzontali e verticali accessibili senza l'uso di scala (comodini, letti, armadi, tavoli, sedie, aste per flebo, tavolini, arredi in genere, piani di lavoro, telefoni, punti luce, plafoniere, suppellettili, davanzali interni, elementi di riscaldamento, estintori, porte, sportelli, maniglie, interruttori, specchi, pulsantiere, corrimano, mensole, ecc...) <u>Disinfettare le superfici*</u> orizzontali e verticali sopra elencate (<u>come da frequenza richiesta dal committente</u>) <u>Scopare ad umido</u> i pavimenti <u>Detergere</u> i pavimenti <u>Disinfettare*</u> i pavimenti <u>se richiesto dal committente</u> <u>Riordinare il locale</u> (sedie sul pavimento, arredi nella posizione originaria, ecc.) <u>Segnalare eventuali anomalie</u> (luci, tapparelle, serrature non funzionanti, presenza di parassiti, ecc.) al committente <p>Intervento di ripasso</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>Svuotare</u> i cestini porta-rifiuti <u>Spolverare ad umido</u> e rimuovere le macchie da tutte le superfici orizzontali e verticali accessibili senza l'uso di scala <u>Scopare ad umido</u> i pavimenti <u>Detergere i pavimenti</u> <u>Riordinare il locale</u> <p>Intervento a vista</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>Rimuovere</u> ragnatele, scritte ed incrostazioni (chewing gum) <u>Detergere</u> cestini portarifiuti <u>Rimuovere</u> orme, macchie ed incrostazioni da vetri, specchi, cristalli, porte e maniglie <u>Disincrostare</u> la rubinetteria ed i lavandini <u>Detergere/disinfettare*</u> ogni superficie in presenza di sporco evidente
NORME DI SICUREZZA	<p>DICLOROISOCIANURATO</p> <ul style="list-style-type: none"> Evitare il contatto con gli occhi Conservare in luogo asciutto fresco e ventilato Non toccare il prodotto con le mani; usare guanti di protezione Non aspirare i fumi una volta applicato (granuli); ventilare l'ambiente <p>IPOCLORITO</p> <ul style="list-style-type: none"> Prodotto concentrato: manipolare con guanti, mascherine + visiera Prodotto diluito: Nessuna particolare precauzione <p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none"> Evitare il contatto con gli occhi. Utilizzare guanti protettivi

SMALTIMENTO

DICLOROISOCIANURATO. PRODOTTO CONCENTRATO:

- Rifiuto Pericoloso
- Raccogliere il liquido e smaltire come rifiuto Tossico Nocivo secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione)

Alla luce del DPR n. 254 del 15 Luglio 2003 "Regolamentazione recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" i disinfettanti scaduti o comunque da eliminare rientrano nella categoria "**RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO**" e vanno smaltiti in **taniche COLORATE (ES. "GIALLE") da 20 Lt con la dicitura R (vedi pag. 11)**

IPOCLORITO

- **Prodotto diluito:** smaltire in rete fognaria
- **Prodotto concentrato:** Smaltire nel contenitore per **RSP-I** (CLINICAL BOX)

CLOREXIDINA

- **Prodotto diluito:** Smaltire in rete fognaria
- **Prodotto concentrato:** Smaltire nel contenitore per **RSP-I** (CLINICAL BOX)

NOTE

- Tenere separate le attrezzature per il trattamento dei servizi igienici
- Il personale che esegue la pulizia terminale deve adottare le stesse precauzioni e le stesse misure di barriera utilizzate quando il malato era presente nella stanza (es. uso di mascherina durante la pulizia terminale dell'unità se il soggetto ricoverato in quella stanza era in regime di isolamento respiratorio).
- Partire dalle aree meno contaminate verso quella più contaminate oppure utilizzare materiale monouso
- Se si utilizza il sistema MOP (doppio secchio e strizzatore) procedere come segue:
 - riempire un secchio di acqua e detergente (o disinfettante), l'altro con acqua
 - bagnare lo straccio o il fiocco lavapavimenti nel secchio contenente il detergente (o il disinfettante) e strizzarlo leggermente
 - pulire la superficie del pavimento effettuando, con il fiocco, un movimento "a zigzag", senza ripassare sulla zona precedentemente trattata
 - sciacquare lo straccio o il fiocco nell'acqua del secondo secchio prima di immergerlo nuovamente nella soluzione detergente.
- VEDI IN DETTAGLIO ALLEGATO N. 4 "SUDDIVISIONE DELL'OSPEDALE IN AREE A DIVERSO GRADO DI RISCHIO"

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

SUPERFICI dei locali a basso rischio

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none"> In caso di versamento di materiale organico, vedi scheda n. 87 "VERSAMENTO ACCIDENTALE DI MATERIALE BIOLOGICO"
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> 10 minuti
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none"> Detergente liquido per pavimenti
DISINFETTANTE	<ul style="list-style-type: none"> Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> Non previsto
MODALITA'	<p>Intervento di Base per locali a basso rischio</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>Aerare</u> il locale evitando correnti moleste <u>Svuotare</u> i cestini porta-rifiuti, pulire il cestino se necessario, <i>eventuale sostituzione</i> del sacchetto <u>Trasportare</u> i rifiuti al punto di raccolta <u>Spolverare ad umido</u> e <u>rimuovere</u> le macchie da tutte le superfici orizzontali e verticali accessibili senza l'uso di scala (armadi, tavoli, sedie, tavolini, arredi in genere, piani di lavoro, telefoni, punti luce, plafoniere, suppellettili, davanzali interni, elementi di riscaldamento, porte, sportelli, maniglie, interruttori, specchi, pulsantiere, corrimano, mensole, ecc...) <u>Scopare ad umido</u> i pavimenti <u>Detergere</u> i pavimenti <u>Riordinare i locali</u> (sedie sul pavimento, arredi nella posizione originaria, ecc.) <u>Segnalare eventuali anomalie</u> (luci, tapparelle, serrature non funzionanti, presenza di parassiti, ecc.) al committente <p>Intervento di Base per cortili e marciapiedi</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>Allontanare</u> i rifiuti (carta, foglie, sudiciume, ecc.) <u>Scopare</u> manualmente o con macchina spazzatrice <u>Pulire</u> con acqua <p>Intervento di ripasso</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>Svuotare</u> i cestini porta-rifiuti, <i>eventuale sostituzione</i> del sacchetto <u>Trasportare</u> i rifiuti al punto di raccolta <u>Spolverare ad umido</u> e rimuovere le macchie da tutte le superfici orizzontali e verticali accessibili senza l'uso di scala <u>Scopare ad umido</u> i pavimenti <u>Detergere i pavimenti</u> <u>Riordinare i locali</u> <p>Intervento a vista Per tutte le aree sopra indicate</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>Rimuovere</u> le ragnatele, scritte sulle pareti, incrostazioni (chewing gum), mozziconi di sigarette <u>Allontanare</u> i rifiuti (carta, foglie, sudiciume, ecc.) <u>Detergere</u> cestini portarifiuti <u>Rimuovere</u> orme, macchie ed incrostazioni da vetri e cristalli, porte e maniglie <u>Pulire</u> ogni superficie in presenza di sporco evidente
NORME DI SICUREZZA	/
SMALTIMENTO	/
NOTE	<ul style="list-style-type: none"> Tenere separate le attrezzature per il trattamento dei servizi igienici Utilizzare i DPI adeguati Partire dalle aree meno contaminate verso quella più contaminate oppure utilizzare materiale monouso Se si utilizza il sistema MOP (doppio secchio e strizzatore) procedere come segue: <ul style="list-style-type: none"> riempire un secchio di acqua e detergente (o disinfectante), l'altro con acqua bagnare lo straccio o il fiocco lavapavimenti nel secchio contenente il detergente (o il disinfectante) e strizzarlo leggermente pulire la superficie del pavimento effettuando, con il fiocco, un movimento "a zigzag", senza ripassare sulla zona precedentemente trattata sciogliere lo straccio o il fiocco nell'acqua del secondo secchio prima di immergerlo nuovamente nella soluzione detergente. VEDI IN DETTAGLIO ALLEGATO N. 4 "SUDDIVISIONE DELL'OSPEDALE IN AREE A DIVERSO GRADO DI RISCHIO"

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI
DISINFEZIONE

TERMOMETRI a MERCURIO

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none">Se necessario¹
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">Se necessario¹
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none">Detergente liquido per stoviglie
DISINFETTANTE	<ul style="list-style-type: none">Ipoclorito di Sodio in soluzione acquosa al 5% (= 50 ML di AMUCHINA + 950 ML di acqua)Clorexidina + Cetrimide in soluzione acquosa all'1% (= 10 ML di Baxidin Concentrato + 990 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">30 minuti per Ipoclorito di Sodio30 minuti per Clorexidina + Cetrimide (Baxidin Concentrato)
MODALITÀ:	<p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none">Se necessario¹ <p>Sanificazione (Termometri <u>ascellari</u>, tra un malato e l'altro oppure al termine della degenza se termometro personale)</p> <ul style="list-style-type: none">Lavare con acqua fredda e detergente liquidoAsciugare <p>Disinfezione (tra un malato e l'altro oppure al termine della degenza se termometro personale)</p> <ul style="list-style-type: none">Immergere in Ipoclorito di Sodio oppure in Clorexidina + Cetrimide, per 30 minuti <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">Asciugare con garze o panno pulito <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">In contenitore chiuso e pulito
NORME DI SICUREZZA	<p>IPOCLORITO DI SODIO</p> <ul style="list-style-type: none">Prodotto concentrato: manipolare con guanti, mascherine + visieraProdotto diluito: Nessuna particolare precauzione <p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">Evitare il contatto con gli occhi.Utilizzare guanti protettivi
SMALTIMENTO	<p>CLOROSSIDANTE</p> <ul style="list-style-type: none">Prodotto diluito: smaltire in rete fognariaProdotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I (CLINICAL BOX) <p>IPOCLORITO DI SODIO</p> <ul style="list-style-type: none">Prodotto diluito: Smaltire in rete fognariaProdotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I (CLINICAL BOX)
NOTE	<ul style="list-style-type: none">Possibilmente personalizzare il termometro per ogni paziente<u>Durante la degenza</u>, se termometro personalizzato è sufficiente lavare il termometro con acqua e detergente, sciacquare, asciugare con panno pulito e riporre il termometro asciutto nella custodiaPrima del riuso su un altro paziente procedere sempre alla disinfezione del termometro

**IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI
DISINFEZIONE**

TERMOMETRO TIMPANICO, apparecchio

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">▪ Non previsto
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Detergente liquido per superfici
DISINFETTANTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Clorexidina + Cetrimide in soluzione acquosa all'1% (= 10 ML di Baxidin Concentrato + 990 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">▪ 30 minuti agire per sfregamento e lasciar asciugare
MODALITA'	<p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Non previsto <p>Sanificazione giornaliera</p> <ul style="list-style-type: none">▪ / <p>Disinfezione settimanale o quando necessaria</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Clorexidina + Cetrimide in soluzione acquosa all'1% (= 10 ML di Baxidin Concentrato + 990 ML di acqua) <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Lasciar asciugare spontaneamente <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ In luogo pulito
NORME DI SICUREZZA	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Evitare il contatto con gli occhi.▪ Utilizzare guanti protettivi
SMALTIMENTO	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto diluito: Smaltire in rete fognaria▪ Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I (CLINICAL BOX)
NOTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Utilizzare solo auricolari monouso▪ Pulire la lente con un panno specifico per lenti ed utilizzare eventualmente un panno di cotone inumidito con alcool▪ Per la pulizia del display non utilizzare molecole alcoliche

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

TONOMETRI E LENTI

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none">Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">Non previsto
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none">Detergente enzimatico (Proteozim plus); tempo di contatto 10 minuti
DISINFETTANTE	<ul style="list-style-type: none">Soluzione acquosa di clorexidina all'1% sterile (= 10 ml Baxidin Concentrato + 990 ML di acqua sterile)* <u>oppure</u>Perossido d'idrogeno 3% (= 10 volumi)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">30 minuti per clorexidina all'1%10 minuti per Perossido d'idrogeno 3%
MODALITA'	<ul style="list-style-type: none">Lavare accuratamente le mani (lavaggio sociale)Indossare guanti di protezione non sterili <p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none">Non previsto <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none">Immergere in soluzione enzimatica (Proteozim plus) per 10 minutiSciacquare con acqua distillata o soluzione fisiologica <p>Disinfezione</p> <ul style="list-style-type: none">Immergere in soluzione acquosa di clorexidina all'1% per almeno 30' oppure in perossido d'idrogeno 3% (= 10 volumi) per almeno 10'<u>Sciacquare abbondantemente</u> con acqua distillata sterile o soluzione fisiologica <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">Asciugare utilizzando un panno morbido pulito ed asciutto <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">Nel contenitore apposito chiuso
NORME DI SICUREZZA	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">Evitare il contatto con gli occhi
SMALTIMENTO	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">Prodotto diluito: Smaltire in rete fognaria
NOTE	<ul style="list-style-type: none">Non utilizzare soluzioni a base alcolica, solventi acidi, o qualsiasi altro prodotto che possa deteriorare il cono o la lenteNon lasciare immerso il dispositivo per tempi lunghi oltre i 30'Non sottoporre il dispositivo a sterilizzazione a vapore o raggi UV* Il prodotto viene fornito, come preparazione galenica, dalla FARMACIALaddove indicato utilizzare materiale monousoRipetere il trattamento dopo ogni utilizzo ed a inizio attività

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI
DISINFEZIONE

UMIDIFICATORE PER AMBIENTE

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none">Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">Non previsto
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none">Detergente liquido per stoviglie
DISINFETTANTE	<ul style="list-style-type: none">Ipoclorito di Sodio in soluzione all'1% (es. AMUCHINA in soluzione all'1% = 10 ML in 990 ML di acqua potabile fredda)Clorexidina + Ceftrime in soluzione acquosa all'1% (= 10 ML di Baxidin Concentrato + 990 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">30 minuti
MODALITA'	<ul style="list-style-type: none">Vuotare l'acqua residua nel serbatoio e nella vaschetta di umidificazioneDecontaminazione<ul style="list-style-type: none">Non previstoSanificazione<ul style="list-style-type: none">Lavare con acqua corrente e detergente liquido per stoviglie tutte le parti smontabili ed immergibiliSciacquare con acqua corrente ed asciugare con panno pulitoDisinfezione<ul style="list-style-type: none">Immergere per almeno 30' in soluzione a base di Ipoclorito di Sodio (es. AMUCHINA in soluzione all'1% = 10 ML di Amuchina + 990 ML di acqua potabile fredda)Per le parti non immergibili utilizzare per sfregamento garza pulita o panno monouso e soluzione a base di Clorexidina e ceftrimeSciacquare con garza o panno monouso ed <u>acqua distillata sterile</u>Asciugatura<ul style="list-style-type: none">Con garza pulita o panno monousoConservazione<ul style="list-style-type: none">In luogo pulito ed al riparo dalla polvere
NORME DI SICUREZZA	<p>IPOCLORITO DI SODIO</p> <ul style="list-style-type: none">Prodotto concentrato: manipolare con guanti, mascherine + visieraProdotto diluito: Nessuna particolare precauzione <p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">Evitare il contatto con gli occhi.Utilizzare guanti protettivi
SMALTIMENTO	<p>IPOCLORITO DI SODIO</p> <ul style="list-style-type: none">Prodotto diluito: smaltire in rete fognariaProdotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I (CLINICAL BOX) <p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">Prodotto diluito: Smaltire in rete fognariaProdotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I (CLINICAL BOX)
NOTE	<ul style="list-style-type: none">Ricomporre tutti gli elementi dell'umidificatoreRiempire solo prima dell'utilizzo con <u>acqua distillata sterile</u>Utilizzare solo soluzioni steriliNon rabboccare residui di soluzioni

VASCA PER IL PARTO

DECONTAMINANTE	▪ Non previsto
TEMPO DI CONTATTO	▪ Non previsto
DETERGENTE	▪ Polvere moderatamente abrasiva priva di iodio e di solventi
DISINFETTANTE	▪ Clorexidina + Cetrimide in soluzione acquosa all'1% (= 100 ML di Baxidin Concentrato + 9900 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	▪ 1 ora
MODALITÀ	<ul style="list-style-type: none">▪ Vuotare la vasca <p>Decontaminazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Non previsto <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Indossare guanti monouso▪ Sciacquare le pareti della vasca utilizzando l'apposita boccetta in dotazione▪ Effettuare la pulizia manuale delle pareti, del fondo vasca, degli accessori utilizzando spugna a perdere, polvere moderatamente abrasiva ed acqua tiepida <p>Disinfezione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Spruzzare le pareti, il fondo e gli accessori con la soluzione a base di Clorexidina + Cetrimide in soluzione acquosa all'1% (= 100 ML di Baxidin Concentrato + 9900 ML di acqua)▪ Lasciare agire per almeno 1 ora▪ Risciacquare la vasca <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Asciugare con panno monouso <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Non previsto
NORME DI SICUREZZA	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Evitare il contatto con gli occhi.▪ Utilizzare guanti protettivi
SMALTIMENTO	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto diluito: Smaltire in rete fognaria• Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I (CLINICAL BOX)
NOTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Eseguire trattamento periodico del soffione doccia come da scheda specifica, PAG. 44 <p>FRANGIFLUSSI TRATTAMENTO</p>

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

VASSOI in materiale plastico

DECONTAMINANTE	<p><u>Se presenza di materiale organico</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Ipoclorito di sodio 2% (= 20 ML di CONEGRINA + 980 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">▪ 30 minuti, per immersione
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Detergente liquido saponoso per stoviglie
DISINFETTANTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Clorexidina + Cetrimide in soluzione acquosa all'1% (= 20 ML di Baxidin Concentrato + 980 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">▪ 30 minuti, per immersione
MODALITÀ	<p><u>Decontaminazione</u> (Se contaminate da materiale organico)</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Immergere in ipoclorito di sodio (=20 ML di CONEGRINA + 980 ML di acqua) per almeno 30 minuti▪ Sciacquare abbondantemente <p><u>Sanificazione</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Detergere con soluzione saponosa▪ Sciacquare▪ Lasciar asciugare <p><u>Disinfezione</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Immergere in soluzione di Clorexidina + Cetrimide all'1% (= 10 ML di Baxidin Concentrato + 990 ML di acqua) per almeno 30 minuti <p><u>Asciugatura</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Asciugare con un panno pulito <p><u>Conservazione</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Conservare protette, in luogo pulito ed asciutto
NORME DI SICUREZZA	<p><u>IPOCLORITO DI SODIO</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto concentrato: manipolare con guanti, mascherine + visiera▪ Prodotto diluito: Nessuna particolare precauzione <p><u>CLOREXIDINA</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Evitare il contatto con gli occhi.▪ Utilizzare guanti protettivi
SMALTIMENTO	<p><u>IPOCLORITO DI SODIO</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto diluito: smaltire in rete fognaria▪ Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I (CLINICAL BOX) <p><u>CLOREXIDINA</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto diluito: Smaltire in rete fognaria▪ Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I (CLINICAL BOX)
NOTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Durante le manovre di ricondizionamento del materiale usare gli adeguati DPI▪ Se è richiesta una situazione di asepsi inviare alla sterilizzazione

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI
DISINFEZIONE

VERSAMENTO ACCIDENTALE DI MATERIALE BIOLOGICO

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Dicloroisocianurato di sodio granuli (BIONIL)▪ Clorexidina + Cetrimide all'1% (= 10 ML di BAXIDIN Concentrato + 990 ML di acqua) <u>per superfici metalliche</u>
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">▪ 10 minuti
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Detergente liquido per superfici
DISINFETTANTE	<ul style="list-style-type: none">▪ /
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">▪ /
MODALITÀ	<ul style="list-style-type: none">▪ Indossare i DPI▪ Circoscrivere l'area da trattare▪ Spargere sul versamento i granuli di Dicloroisocianurato▪ Lasciare agire per almeno 10 minuti▪ Asportare tramite panno carta o altro materiale a perdere <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Vedi scheda superfici ad alto medio e basso rischio (pag. 73-78-80) <p>Disinfezione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Vedi scheda superfici ad alto medio e basso rischio (pag. 73-78-80) <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Non previsto <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Non previsto
NORME DI SICUREZZA	<p>DICLOROISOCIANURATO</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Evitare il contatto con gli occhi▪ Conservare in luogo asciutto fresco e ventilato▪ Non toccare il prodotto con le mani; usare guanti di protezione▪ Non aspirare i fumi una volta applicato (granuli); ventilare l'ambiente <p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Evitare il contatto con gli occhi.▪ Utilizzare guanti protettivi
SMALTIMENTO	<p>DICLOROISOCIANURATO. PRODOTTO CONCENTRATO:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Rifiuto Pericoloso▪ Raccogliere il liquido e smaltire come rifiuto Tossico Nocivo secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto diluito: Smaltire in rete fognaria▪ Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I (CLINICAL BOX)
NOTE	<ul style="list-style-type: none">• Circoscrivere immediatamente l'area da trattare• Utilizzare i DPI adeguati• Utilizzare il granulato assorbente• Eliminare quanto monouso• Trattare quanto riutilizzabile

IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

VISOR

DECONTAMINANTE	<ul style="list-style-type: none"> Se necessario ¹
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> 30 minuti
DETERGENTE	<ul style="list-style-type: none"> Sapone liquido per stoviglie
DISINFETTANTE	<ul style="list-style-type: none"> Clorexidina + Cetrimide all'1% (= 10 ML di BAXIDIN Concentrato + 990 ML di acqua)
TEMPO DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none"> 1 ora
MODALITÀ	<ul style="list-style-type: none"> Indossare guanti di protezione <p>Decontaminazione (SE NECESSARIO)</p> <ul style="list-style-type: none"> Se necessario ¹ <p>Sanificazione</p> <ul style="list-style-type: none"> Detergere con acqua e sapone liquido per stoviglie Sciacquare ed asciugare <p>Disinfezione SETTIMANALE</p> <ul style="list-style-type: none"> Immergere in soluzione acquosa di Clorexidina + Cetrimide all'1% (= 10 ML di BAXIDIN Concentrato + 990 ML di acqua), per 1 ora <p>Asciugatura</p> <ul style="list-style-type: none"> Asciugare con panno pulito <p>Conservazione</p> <ul style="list-style-type: none"> In luogo accessibile
NORME DI SICUREZZA	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none"> Evitare il contatto con gli occhi. Utilizzare guanti protettivi <p>POLIFENOLI</p> <ul style="list-style-type: none"> Evitare contatto con occhi e cute Indossare occhiali, guanti e camici protettivi Proteggere dalle alte temperature Non respirare i vapori; utilizzare contenitori chiusi
SMALTIMENTO	<p>CLOREXIDINA</p> <ul style="list-style-type: none"> Prodotto diluito: Smaltire in rete fognaria Prodotto concentrato: Smaltire nel contenitore per RSP-I (CLINICAL BOX) <p>POLIFENOLI - PRODOTTO CONCENTRATO</p> <ul style="list-style-type: none"> Rifiuto Speciale Pericoloso Raccogliere il liquido e smaltire come rifiuto Tossico Speciale Pericoloso secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>POLIFENOLI - PRODOTTO DILUITO a concentrazione < 1%</p> <ul style="list-style-type: none"> Rifiuto Speciale. Raccogliere il liquido e smaltire secondo le disposizioni Nazionali (mediante termodistruzione) <p>Alla luce del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamentazione recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" i disinfettanti scaduti o comunque da eliminare rientrano nella categoria "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO" e vanno smaltiti in taniche COLORATE (ES. "GIALLE") da 20 Lt con la dicitura R (vedi pag. 11)</p>
NOTE	<ul style="list-style-type: none"> Prevedere trattamento completo 1 volta alla settimana ed ogni qual volta vi sia l'indicazione In caso di contaminazione o se indicato procedere a disinfezione estemporanea con Alcool Denaturato



IL LAVAGGIO DELLE MANI E' OPERAZIONE PRELIMINARE A QUALSIASI MANOVRA DI ANTISEPSI E DI DISINFEZIONE

ALLEGATO 2

PROSPETTO RIASSUNTIVO

NOME COMMERCIALE	PRINCIPIO ATTIVO in 100 ML	DILUIZIONE		CAMPO D'APPLICAZIONE	pag.	SOLUZIONE DILUITA
ACIDO PERACETICO STERIS SYSTEM	Acido peracetico 37-40%	Usare puro		Trattamento endoscopi	71	/
ACQUA OSSIGENATA	Perossido di idrogeno 3 g (= 10 vol.)	Usare puro		Cavo orale (antisepsi) Ferita chirurgica non traumatica Ferita chirurgica traumatica Fonometri e lenti	34 42 43 84	/
ALCOOL ETILICO 70°		Usare puro		Cappe di classe II Rischio biologico Cappe a flusso laminare verticale	27 28	/
AMUCHINA Flacone 1 LT Tanica 5 Lt	Cloro attivo 1,1%; Cloruro di sodio 18%	1%	= 10 ML in 990 ML di Acqua	Umidificatore per ambiente	85	1 mese <u>Eliminare dopo ogni immersione</u>
		5%	= 50 ML in 950 ML di Acqua	Apparecchio del Catani Capezzoli Contenitori pluriuso/dispenser /riutilizzabili/spazzolini/scovolini Ferita chirurgica non traumatica Gorgogliatori per ossigenoterapia non sterilizzabili Perineo- antisepsi Termometri a mercurio	15 26 35 42 46 59 82	
		10%	= 100 ML in 900 ML di Acqua	Ambu Cannule orofaringee riutilizzabili Kit per aerosol terapia (mascherina o boccaglio, ampolla e tubo) Maschere per pallone Ambu	14 25 49 54	
		2%	= 20 ML in 980 ML di acqua	Aspiratori di secrezioni Superfici dei locali a medio rischio	19 79	
ANTISAPRIL tanica da 5 LT	Clorossidante Elettrolitico 2,8 g	5%	= 50 ML in 950 ML di acqua	Superfici dei locali ad alto rischio sala settoria Superfici dei locali ad alto rischio	76 74	24 ore
BAXIDIN CONCENTRATO	Clorexidina 1.5 g + Cetrimide in soluzione acquosa	1%	oppure = 25 ML in 2475 ML di acqua oppure = 10 ML in 990 ML di acqua	Apparecchiature elettromedicali	16	1 mese <u>Eliminare dopo ogni immersione</u>
				Arcelle	17	
				Arredi	18	
				Attrezzature non invasive riutilizzabili	20	
				Attrezzature per il trasporto dell'assistito	21	
				Auricolari riutilizzabili x otoscopi	22	
				Carrelli/attrezzature per il trasporto dei materiali	29	
				igiene dei genitali delle pazienti, durante il parto	47	
				Lame laringoscopio	50	
				Laringoscopio – otoscopio	51	
				Padelle, pappagalli, vasini, arbarelle, bacinella della sedia comoda	57	
				Sonda ecografia lineare e vaginale	65	
				Superfici dei locali ad alto rischio	74	
				Superfici sala settoria	76	
				Superfici sala settoria per paziente affetta da CJ	77	
				Superfici dei locali a medio rischio	79	
				Termometri a mercurio	82	
Termometro timpanico	83					
Umidificatore per ambiente	85					
Vasca per il parto	86					
Vassoi in materiale plastico	87					
Versamento accidentale di materiale biologico	88					
Visor e visiera	89					
BAXIDIN PRONTO ALL'USO	Clorexidina 1.5 g + Cetrimide in soluzione acquosa	Usare puro		Incubatrice	48	/

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3	Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale	Pag. 91 P.T. 01/06 REV. 01
--	---	---

NOME COMMERCIALE	PRINCIPIO ATTIVO in 100 ML	DILUIZIONE		CAMPO D'APPLICAZIONE	pag.	SOLUZIONE DILUITA		
BETADINE CHIRURGICO	Iodopovidone 10% soluzione saponosa	Usare puro		Lavaggio antisettico delle mani	52	/		
				Lavaggio chirurgico delle mani	53			
				Preparazione paziente chirurgico	61			
BETADINE soluzione	Povidone Iodio al 10% soluzione acquosa	Usare puro		Abrasioni – escoriazioni	13	/		
				Campo operatorio	24			
				Cateterismo venoso centrale (inserimento/medicazione)	30			
				Cateterismo venoso periferico	31			
				Cateterismo vescicale (antisepsi del meato urinario)	32			
				Cateterismo vescicale (tecnica)	33			
				Cute Integra (preparazione intervento chirurgico)	37			
				Cute integra (per biopsia e punture esplorative)	38			
				Cute integra per im, ev, prelievi venosi o arteriosi	39			
				Cute integra (posizionamento cannule)	40			
				Ferita chirurgica non traumatica	42			
				Perineo- antisepsi	59			
				Piaghe da decubito	62			
BIONIL (NaDCC) da 4,6 gr	Dicloroisocianurato	0,025%	= 1 cpr in 10.000 ML di acqua	Frangiflussi, soffioni doccia	44	<u>24 ore</u>		
				Soffioni doccia	64			
				0,1%	= 2 cpr in 5000 ML di acqua		Superfici dei locali ad alto rischio	74
							Superfici dei locali a medio rischio	79
				0,5%	= 2 cpr in 1000 ML di acqua		Superfici dei locali ad alto rischio – sala settoria	76
Superfici sala settoria per paziente affetto da CJ		77						
2%		= 8 cpr in 1000 ML di acqua	Decontaminazione oggetti e superfici (materiale poroso)	41				
			Strumenti utilizzati su paziente con CJ	70				
Superfici sala settoria per paziente affetto da CJ (versamento)		77						
BIONIL (NaDCC)			GRANULI		Versamento accidentale di materiale biologico		88	/
BRAUNODERM spray 10%		Iodopovidone 10%	Usare puro		Cateterismo venoso centrale (inserimento/medicazione)		30	/
					Cateterismo venoso periferico		31	
					Cute integra (per biopsia e punture esplorative)		38	
	Cute integra per im, ev, prelievi venosi o arteriosi				39			
CIDEX	Glutaraldeide 2%	Attivare al momento		Strumenti endoscopici (lavaggio manuale e disinfezione)	71	<u>14 gg</u>		
CLOREXIDINA COLLUTORIO	0,5% - 1%	Usare puro		Cavo orale (antisepsi)	34	/		
CLOREXIDINA 1% STERILE IN SOLUZIONE ACQUOSA	Clorexidina Digluconato 0,5 g			Tonometri e lenti	84	<u>1 mese</u> <u>Eliminare dopo ogni immersione</u>		
CLOREXIDINA 0,5 % STERILE IN SOLUZIONE ACQUOSA	Clorexidina Digluconato 0,5 g	Usare puro		Cute Integra per terapia iniettiva (im, ev, arteriosi)	39	/		
				Cute integra posizionamento cannule	40			

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3	Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale	Pag. 92 P.T. 01/06 REV. 01
--	---	---

NOME COMMERCIALE	PRINCIPIO ATTIVO in 100 ML	DILUIZIONE		CAMPO D'APPLICAZIONE	pag.	SOLUZIONE DILUITA
CLOREXIN TINTURA flacone da 1 LT	Clorexidina Digluconato 0,5 g + Etanolo 95° 70 g	Usare puro		Cateterismo venoso centrale (inserim/medicazione)	30	/
				Cateterismo venoso periferico	31	
				Cute integra (preparazione alla biopsia ed alle punture esplorative)	38	
				Cute integra per terapia iniettiva (im, ev, prelievi venosi o arteriosi)	39	
				Cute integra (posizionamento cannule)	40	
Raccordi, tappi in gomma, punti di iniezione su gommini	63					
CONGRINA	Ipoclorito di sodio 6 – 7%	0,1%	= 200 ML in 9800 ML di acqua	Superfici dei locali ad alto rischio	74	<u>24 ore</u>
				Superfici dei locali a medio rischio	78	
		0,5%	= 1 L in 10 LT di acqua	Superfici dei locali ad alto rischio con materiale organico	74	
				Sala settoria	76	
				Superfici sala settoria per paziente affetta da CJ	77	
DETERGENTE INTIMO				Perineo – detersione	60	/
DETERGENTE LIQUIDO PER PAVIMENTI			Vedi in dettaglio tipo di prodotto	Superfici dei locali	74 76 77 79 81	/
DETERGENTE LIQUIDO SAPONOSO PER STOVIGLIE			Vedi in dettaglio tipo di prodotto	Flussimetri per ossigeno aria compressa e manometri per vuoto	45	/
ELETTROLISI ACIDA			PH 2,7	Strumenti endoscopici (lavaggio manuale e disinfezione)	71	/
FARVICETT	Clorexidina 0.015 g + Cetrimide	Usare puro		Cateterismo vescicale (antisepsi del meato urinario) Cateterismo vescicale (tecnica) Ferita chirurgica non traumatica	32 33 42	/
FENPLUS	O-benzil-p-clorofenilamifenolo 3,2%		= 82 ML in 968 di acqua	Decontaminazione strumenti chirurgici Strumenti chirurgici decontaminazione Visor	41 67 89	<u>7 giorni</u> <u>Eliminare dopo ogni immersione</u>
FENPLUS HWP Buste da 50 ML Flacone da 1 LT Tanica da 5 LT	O-benzil-P-clorofenolo g. 8.2 + P-ter-amifenolo g 2.3 +O-fenilfenolo g 11,4	1%	= 10 ML in 990 di acqua	Decontaminazione strumenti chirurgici Strumenti chirurgici decontaminazione Strumenti per il riscontro autoptico	41 67 69	<u>7 giorni</u> <u>Eliminare dopo ogni immersione</u>

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3	Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale	Pag. 93 P.T. 01/06 REV. 01
--	---	---

NOME COMMERCIALE	PRINCIPIO ATTIVO in 100 ML	DILUIZIONE		CAMPO D'APPLICAZIONE	pag.	SOLUZIONE DILUITA
HIBISCRUB	Clorexidina 4% in soluzione saponosa	Usare puro		Lavaggio antisettico delle mani Lavaggio chirurgico delle mani Preparazione paziente chirurgico	52 53 61	/
IDROSSIDO DI SODIO (NaOH)		1N	= 40 gr in 1000 ML di acqua	Strumenti utilizzati su paziente con sospetta CJ	70	<u>1 mese</u> Eliminare dopo ogni immersione
IDROSSIDO DI SODIO (NaOH)		2N	= 80 gr in 1000 ML di acqua	Sala settoria per paz. Con CJ	77	<u>1 mese</u> Eliminare dopo ogni immersione
KATOXYN SPRAY	Argento catadinico	Usare puro		Cordone ombelicale Moncone ombelicale	36 55 62	/
MILTON	Sodio Ipoclorito g 1,1; Sodio Cloruro g. 16,5	1%	= 10 ML in 990 ML di acqua	Biberon e tettarelle riutilizzabili	23	<u>24 ore</u>
NEOXINAL	Clorexidina 0,05%	Usare puro		Cateterismo vescicale (antisepsi del meato urinario) Cateterismo vescicale (tecnica) Ferita chirurgica traumatica	32 33 43	/
ORASEPTIC	Esetidina	Usare puro		Cavo orale (antisepsi)	34	/
POVI IODINE SCRUB	Iodopovidone 10% soluzione saponosa	Usare puro		Lavaggio antisettico delle mani Lavaggio chirurgico delle mani Preparazione paziente chirurgico	52 53 61	/
PROTEOZIM PLUS Detergente enzimatico	Enzimi totali gr 4, tensioattivi non ionici gr. 43, tensioattivi anionici gr. 10, antischiuma, sequestranti, coformulanti acqua depurata q.b a 100 ml	2,5%	<u>= 25 ml in un litro di acqua</u>	Decontaminazione oggetti e superfici chirurgici Strumenti (Decontaminazione)	41 67	/
SAPONE LIDUIDO PER MANI		Usare puro		Lavaggio semplice delle mani	51	/
SAUGELLA	Emulsione detergente a ph 3,5	= 3/4 cucchiaini per litro di acqua		Stomie – detersione della cute peristomale	58 66	/

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3	Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale	Pag. 94 P.T. 01/06 REV. 01
--	---	---

ALLEGATO N. 3

SCHEDE DELLE MOLECOLE DISINFETTANTI/ANTISETTICHE

**ACQUA OSSIGENATA 10 VOLUMI
PEROSSIDO DI IDROGENO AL 3%**

SPETTRO D'AZIONE

Debole azione su batteri e virus. Alto potere di detersione. E' un composto attivo in quanto agisce liberando ossigeno.

CARATTERISTICHE:

Liquido limpido, incolore e fotosensibile. Si decompone facilmente con il calore e in presenza di metalli pesanti.

INDICAZIONI:

In ambito ospedaliero l'*acqua ossigenata* è indicata per:

- Detersione di ferite sporche e/o di origine traumatica
- Disinfezione di tonometri e di lenti a contatto morbide.

CONTROINDICAZIONI:

- E' incompatibile con sostanze riducenti (sostanze organiche e ossidabili), ioduri, alcali, permanganati, iposolfiti, iodio e sali ferrosi. Per questo motivo non deve mai essere utilizzata con altri antisettici o disinfettanti

AVVERTENZE:

Deve essere conservata in flacone ben chiuso al riparo dalla luce (fotosensibile), a temperatura non superiore a 35°C.

UTILIZZO	NOME COMMERCIALE	CONFEZIONE	CONCENTRAZIONE	DILUIZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Detersione di ferite sporche e/o di origine traumatica • Disinfezione di tonometri e di lenti a contatto morbide. 	<ul style="list-style-type: none"> • Acqua ossigenata • Perossido di idrogeno 	200 ML.	3% - 10 volumi	Pronta all'uso

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3	Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale	Pag. 95 P.T. 01/06 REV. 01
--	---	---

CLOREXIDINA GLUCONATO SAPONOSA

SPETTRO D'AZIONE:

Attiva su Gram pos., Gram neg., lieviti e muffe, funghi e miceti, non attiva sul micobatterio tubercolare.

CARATTERISTICHE:

Solubile in acqua e in alcool, fotosensibile. L'azione battericida viene esaltata dall'aumento della temperatura.

INDICAZIONI:

In ambito ospedaliero la **Clorexidina Gluconato** è indicata per:

- Lavaggio antisettico delle mani.

CONTROINDICAZIONI:

- Evitare il contatto con gli occhi e con l'orecchio medio (ototossica).
- Può provocare dermatiti eczematose da contatto.
- Incompatibile con sapone, carbonati, borati, solfati, cloruri e fosfati.

AVVERTENZE:

L'attività antibatterica è inibita dalla presenza di materiale organico (sangue, pus).

Deve essere conservata al riparo dalla luce e dal calore.

UTILIZZO	NOME COMMERCIALE	CONFEZIONE	CONCENTRAZIONE	DILUIZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Lavaggio antisettico delle mani 	HIBISCRUB	500 ML.	4%	Pronto all'uso

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3	Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale	Pag. 96 P.T. 01/06 REV. 01
--	---	---

CLOREXIDINA GLUCONATO NON SAPONOSA

SPETTRO D'AZIONE:

Attiva su Gram pos., Gram neg., lieviti e muffe, funghi e miceti, non attiva sul micobatterio tubercolare.

CARATTERISTICHE:

Solubile in acqua e in alcool, fotosensibile. L'azione battericida viene esaltata dall'aumento della temperatura.

INDICAZIONI:

In ambito ospedaliero la **Clorexidina Gluconato non saponosa** è indicata per:

- Disinfezione di cute lesa (ferite, ustioni);
- Antisepsi esterna in ostetricia e urologia
- Disinfezione del meato urinario

CONTROINDICAZIONI:

- Evitare il contatto con gli occhi e con l'orecchio medio (ototossica).
- Può provocare dermatiti eczematose da contatto.

AVVERTENZE:

Non usare per periodi prolungati, non superare le dosi consigliate di 3-4 volte/die.

Non usare con altri detergenti.

L'attività antibatterica è inibita dalla presenza di materiale organico (sangue, pus).

Deve essere conservata al riparo dalla luce e dal calore.

UTILIZZO	NOME COMMERCIALE	CONFEZIONE	CONCENTRAZIONE	DILUIZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Disinfezione di cute lesa (ferite, ustioni); • Antisepsi esterna in ostetricia e urologia • Disinfezione del meato urinario 	NEOXINAL	buste da 25 ML. sterili	Clorexidina 0,05%	Pronta all'uso

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3	Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale	Pag. 97 P.T. 01/06 REV. 01
--	---	---

CLOREXIDINA CON CETRIMIDE

SPETTRO D'AZIONE:

Attiva su Gram pos., Gram neg., lieviti e muffe, funghi e miceti, non attiva sul micobatterio tubercolare.

CARATTERISTICHE:

Solubile in acqua e in alcool, fotosensibile. L'azione battericida viene esaltata dall'aumento della temperatura.

INDICAZIONI:

In ambito ospedaliero la **Clorexidina + Cetrimide** è indicata per:

- Disinfezione di superfici e suppellettili in alternativa al clorossidante elettrolitico.

CONTROINDICAZIONI:

- Evitare il contatto con gli occhi e con l'orecchio medio (ototossica).
- Può provocare dermatiti eczematose da contatto.

AVVERTENZE:

L'attività antibatterica è inibita dalla presenza di materiale organico (sangue, pus).

Deve essere conservata al riparo dalla luce e dal calore.

UTILIZZO	NOME COMMERCIALE	CONFEZIONE	CONCENTRAZIONE	DILUIZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Disinfezione superfici e suppellettili 	BAXIDIN CONCENTRATO concentrato	buste da 25 ML.	Cetrimide 15% Clorexidina 1,5%	1 busta in 2.475 ML. di H ₂ O



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3	Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale	Pag. 98 P.T. 01/06 REV. 01
--	---	---

CLOREXIDINA GLUCONATO CON CETRIMIDE

SPETTRO D'AZIONE:

Attiva su Gram pos., Gram neg., lieviti e muffe, funghi e miceti, non attiva sul micobatterio tubercolare.

CARATTERISTICHE:

Solubile in acqua e in alcool, fotosensibile. L'azione battericida viene esaltata dall'aumento della temperatura.

INDICAZIONI:

In ambito ospedaliero la **Clorexidina Gluconato non saponosa** è indicata per:

- Disinfezione di cute lesa (ferite, ustioni);
- Disinfezione cute integra
- Antisepsi esterna in ostetricia e urologia
- Disinfezione del meato urinario

CONTROINDICAZIONI:

- Evitare il contatto con gli occhi e con l'orecchio medio (ototossica). Può provocare dermatiti eczematose da contatto.

AVVERTENZE

Non usare per periodi prolungati, non superare le dosi consigliate di 3-4 volte/die.

Non usare con altri detergenti.

L'attività antibatterica è inibita dalla presenza di materiale organico (sangue, pus).

Deve essere conservata al riparo dalla luce e dal calore.

UTILIZZO	NOME COMMERCIALE	CONFEZIONE	CONCENTRAZIONE	DILUIZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Disinfezione di cute lesa (ferite, ustioni); • Disinfezione cute integra • Antisepsi esterna in ostetricia e urologia • Disinfezione del meato urinario 	<p align="center">FARVICETT</p>	<p align="center">buste da 25 ML. sterili</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Clorexidina g. 0,015 • Cetrimide g. 0,150 	<p align="center">Pronta all'uso</p>

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3	Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale	Pag. 99 P.T. 01/06 REV. 01
--	---	---

CLOREXIDINA ALCOOLICA

SPETTRO D'AZIONE:

Attiva su Gram pos., Gram neg., lieviti e muffe, funghi e miceti, non attiva sul micobatterio tubercolare.

CARATTERISTICHE:

Solubile in acqua e in alcool, fotosensibile. L'azione battericida viene esaltata dall'aumento della temperatura.

INDICAZIONI:

In ambito ospedaliero la *Clorexidina Alcoolica* è indicata per:

- Antisepsi cute integra
- Disinfezione termometri
- Disinfezione tappi perforabili
- Disinfezione punti di iniezione linee infusionali, sistemi raccolta urina.

CONTROINDICAZIONI:

- Evitare il contatto con gli occhi e con l'orecchio medio (ototossica).
- Può provocare dermatiti eczematose da contatto.
- Incompatibile con sapone, carbonati, borati, solfati, cloruri e fosfati.

AVVERTENZE:

L'attività antibatterica è inibita dalla presenza di materiale organico (sangue, pus).

Deve essere conservata al riparo dalla luce e dal calore.

UTILIZZO	NOME COMMERCIALE	CONFEZIONE	CONCENTRAZIONE	DILUIZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Disinfezione cute integra, termometri, tappi perforabili, punti di iniezione linee infusionali e sistemi di raccolta urina. 	CLOREXIN TINTURA	1 LITRO	Clorexidina 0,5%	Pronto all'uso

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3	Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale	Pag. 100 P.T. 01/06 REV. 01
--	---	--

GLUTARALDEIDE

SPETTRO D'AZIONE:

Attivo su spore, virus, batteri, funghi, micobatterio tubercolare, pseudomonas.

CARATTERISTICHE:

Liquido limpido di odore sgradevole. Deve essere eliminato come rifiuto tossico-nocivo.

INDICAZIONI:

In ambito ospedaliero la **glutaraldeide** è indicata per:

- Disinfezione ad alto livello di presidi che non possono essere sterilizzati in autoclave (es. endoscopi).
- Sterilizzazione di presidi che non possono essere sterilizzati in autoclave, mantenendo un tempo di contatto di 8-10 ore

CONTROINDICAZIONI:

AVVERTENZE:

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, l'inalazione, l'ingestione.

Durante l'utilizzo, aerare il locale e indossare i dispositivi di protezione: guanti, filtranti facciali di classe FFP1, camici idrorepellenti, VISOR.

Al termine della disinfezione risciacquare accuratamente i presidi con **H₂O sterile**.

La soluzione attivata non può essere usata oltre il limite indicato di 14 gg.

Conservare il recipiente ben chiuso.

UTILIZZO	NOME COMMERCIALE	CONFEZIONE	CONCENTRAZIONE	DILUIZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Disinfezione ad alto livello di endoscopi • Sterilizzazione di presidi (8-10 ore) 	CIDEX	<ul style="list-style-type: none"> • Tanche da 5 l. • Flaconi da 1 l. 	2%	Da attivare (con sale attivante)

<p>SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3</p>	<p>Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale</p>	<p>Pag. 101 P.T. 01/06 REV. 01</p>
--	---	--

**ODOPOVIDONE
IN SOLUZIONE ALCOLICA AL 10%**

SPETTRO D'AZIONE:

Attiva su Gram pos., Gram neg., funghi e virus, micobatterio tubercolare.

CARATTERISTICHE:

Color giallo-bruno con odore caratteristico. Solubile in acqua e in alcool.

INDICAZIONI :

In ambito ospedaliero lo **ODOPOVIDONE in soluzione alcolica** è indicato per:

- preparazione del campo operatorio
- antisepsi della cute integra
- antisepsi del punto di accesso del trattamento dialitico

CONTROINDICAZIONI

- Sono state segnalate reazioni di ipersensibilità in soggetti allergici allo iodio.
- Lo IODOPOVIDONE è incompatibile con l'acqua ossigenata e non deve essere usato contemporaneamente ad agenti topici contenenti derivati mercuriali.
- L'attività antisettica può essere inibita dagli alcali.
- Non deve essere usato in bambini con età < a 6 mesi

TEMPO DI CONTATTO MINIMO CONSIGLIATO: 30" – 2 MINUTI

Sono state segnalate reazioni di ipersensibilità in soggetti allergici allo iodio.

L'attività antisettica può essere inibita dagli alcali.

AVVERTENZE:

Deve essere conservato al riparo dalla luce e dal calore.

UTILIZZO	NOME COMMERCIALE	CONFEZIONE	CONCENTRAZIONE	DILUIZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Preparazione campo operatorio • Antisepsi cute integra 	BRAUNODERM SPRAY	250 ML.	10%	Pronto all'uso

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3	Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale	Pag. 102 P.T. 01/06 REV. 01
--	---	--

**IODOPOVIDONE
IN SOLUZIONE ACQUOSA**

SPETTRO D'AZIONE:

Attiva su Gram pos., Gram neg., funghi e virus, micobatterio tubercolare.

CARATTERISTICHE:

Color giallo-bruno con odore caratteristico. Solubile in acqua e in alcool.

INDICAZIONI :

In ambito ospedaliero lo **IODOPOVIDONE in soluzione acquosa** è indicato per:

- Antisepsi di ferite e mucose
- Antisepsi di ustioni se inferiori al 20-30% della superficie corporea
- Preparazione campo operatorio
- Lavaggi endocavitari

CONTROINDICAZIONI :

- Sono state segnalate reazioni di ipersensibilità in soggetti allergici allo iodio.
- Lo IODOPOVIDONE è incompatibile con l'acqua ossigenata e non deve essere usato contemporaneamente ad agenti topici contenenti derivati mercuriali.
- L'attività antisettica può essere inibita dagli alcali.
- Non deve essere usato in bambini con età < a 6 mesi

AVVERTENZE:

Deve essere conservato al riparo dalla luce e dal calore.

Effetto corrosivo sui metalli e su alcuni materiali plastici

UTILIZZO	NOME COMMERCIALE	CONFEZIONE	CONCENTRAZIONE	DILUIZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Antisepsi ferite e mucose • Antisepsi ustioni <20% • Campo operatorio • Lavaggi endocavitari 	BETADINE 10%	100 ML.	10%	Pronto all'uso



<p>SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3</p>	<p>Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale</p>	<p>Pag. 103 P.T. 01/06 REV. 01</p>
--	---	--

**ODOPOVIDONE
IN SOLUZIONE IDROALCOOLICA**

SPETTRO D'AZIONE:

Attiva su Gram pos., Gram neg., funghi e virus, micobatterio tubercolare.

CARATTERISTICHE:

Color giallo-bruno con odore caratteristico. Solubile in acqua e in alcool.

INDICAZIONI:

In ambito ospedaliero lo **ODOPOVIDONE in soluzione idroalcoolica** è indicato per:

- Detersione e disinfezione delle mani
- antisepsi della cute integra

TEMPO DI CONTATTO MINIMO CONSIGLIATO: 2 minuti

CONTROINDICAZIONI:

- Sono state segnalate reazioni di ipersensibilità in soggetti allergici allo iodio.
- L'attività antisettica può essere inibita dagli alcali.
- Lo IODOPOVIDONE è incompatibile con l'H₂O₂ e non deve essere usato contemporaneamente ad agenti topici contenenti derivati mercuriali.
- Non deve essere usato in bambini di età inferiore ai 6 mesi.

AVVERTENZE:

Deve essere conservato al riparo dalla luce e dal calore.

UTILIZZO	NOME COMMERCIALE	CONFEZIONE	CONCENTRAZIONE	DILUIZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Detersione e disinfezione delle mani • Antisepsi cute integra 	<p>BETADINE CHIRURGICO POVI IODINE SCRUB 10%</p>	<p>Flacone 1 l.</p>	<p>10% di iodio</p>	<p>Pronto all'uso</p>

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3	Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale	Pag. 104 P.T. 01/06 REV. 01
--	---	--

**IPOCLORITO DI SODIO
AMUCHINA**

SPETTRO D'AZIONE:

Attivo su Gram pos., Gram neg., virus, micobatterio tubercolare, spore di tetano e del carbonchio, miceti.

CARATTERISTICHE:

Liquido incolore. Isotonico alla concentrazione del 5%; ipertonico alla concentrazione del 10%.

INDICAZIONI:

In ambito ospedaliero **l'Amuchina** è indicata per:

- antisepsi di piaghe, ulcere, ferite, ustioni e mucose (= 5%)
- trattamento per il distacco di tessuti necrotici (= 5%)
- antisepsi gengive, denti, prima e dopo l'estrazione dentaria (= 5%)
- disinfezione maschere ambu, gorgogliatori O₂, apparecchio del Catani, cannule Mayo, etc. (= al 5% o 10%).

CONTROINDICAZIONI:

L'amuchina può essere decomposta da: sostanze organiche, luce solare, anidride carbonica, metalli riducenti (Fe, Cu), carta bibula.

AVVERTENZE:

Deve essere conservata al riparo dalla luce e dal calore.

UTILIZZO	NOME COMMERCIALE	CONFEZIONE	CONCENTRAZIONE	DILUIZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Antisepsi di piaghe, ulcere, ferite, ustioni, mucose; • Trattamento per distacco tessuti necrotici; • Antisepsi gengive, denti; • Attrezzature varie 	AMUKINE MED AMUCHINA	250 -500 ML 1 LT – 5LT	0.05% 1,1%	Pronta all'uso Da diluire



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3	Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale	Pag. 105 P.T. 01/06 REV. 01
--	---	--

**CLOROSSIDANTE ELETTROLITICO
ANTISAPRIL**

SPETTRO D'AZIONE:

Attivo su Gram pos., Gram neg., virus, micobatterio tubercolare, spore di tetano e del carbonchio, miceti.

CARATTERISTICHE:

Liquido limpido con odore gradevole. Solubile in acqua fredda.

INDICAZIONI:

In ambito ospedaliero l'**Antisapril** è indicato per:

- Disinfezione superfici e pavimenti (= 2-5%) previa corretta pulizia


CONTROINDICAZIONI:

- Incompatibile con le sostanze riducenti sia organiche (sostanze grasse, proteine), sia inorganiche (solfuri, nitriti) e con alcuni metalli.

AVVERTENZE:

Conservare al riparo dalla luce e dal calore.

UTILIZZO	NOME COMMERCIALE	CONFEZIONE	CONCENTRAZIONE	DILUIZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Disinfezione superfici non metalliche e pavimenti 	ANTISAPRIL	5 l.	2% 5%	20 ML. in 980 ML. H ₂ O 50 ML. in 950 ML. H ₂ O



<p>SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3</p>	<p>Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale</p>	<p>Pag. 106 P.T. 01/06 REV. 01</p>
---	--	--

IPOCLORITO DI SODIO
Milton

SPETTRO D'AZIONE:
Attivo su batteri gram positivi e gram negativi, virus, miceti.

CARATTERISTICHE:
Liquido di colore giallo paglierino, odore leggermente pungente di cloro, solubile in acqua, non solubile in grassi.

INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI:

- In ambito ospedaliero il *Milton* è indicato per:
- disinfezione di poppatoi e tettarelle con **tempo di contatto di 90'**

AVVERTENZE:
Se ingerito può avere effetto irritante nelle mucose del tratto digerente.

UTILIZZO	NOME COMMERCIALE	CONFEZIONE	CONCENTRAZIONE	DILUIZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Disinfezione di poppatoi e tettarelle 	<p>MILTON</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Flacone 1 l. 	<p>1.25 %</p>	<p>12,5 ML. in 987 ML. di H₂O</p>

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3	Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale	Pag. 107 P.T. 01/06 REV. 01
--	---	--

SODIO DICLOROISOCIANURATO DI IDRATO

SPETTRO D'AZIONE:
 Attivo su Gram pos., Gram neg., virus, micobatterio tubercolare, spore, miceti.

CARATTERISTICHE:
 Granuli bianchi da versare direttamente sul prodotto biologico da trattare
 Compresse da 4,6 gr. solubili in acqua.

INDICAZIONI:
 In ambito ospedaliero il **sodio dicloroisocianurato** è indicato per:

- Decontaminazione di superfici non metalliche in caso di imbrattamento da materiale biologico.
- Disinfezione di superfici non metalliche e di pavimenti (compresse).

CONTROINDICAZIONI:

- Non utilizzare i granuli in presenza di acidi (comprese le urine) in quanto sviluppano gas cloro irritanti per le vie respiratorie.

AVVERTENZE:
 Indossare presidi di protezione: mascherina, guanti, camici monouso, eventualmente VISOR.
 Il contenitore deve essere conservato ben chiuso e al riparo dall'umidità.
 Non miscelare con acidi e formaldeide.
 Non utilizzare puro su superfici metalliche.

UTILIZZO	NOME COMMERCIALE	CONFEZIONE	CONCENTRAZIONE	DILUIZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Decontaminazione superfici non metalliche imbrattate da materiale organico • Disinfezione superfici e pavimenti 	BIONIL Granuli BIONIL cpr.	Barattoli da 500 gr. Barattolo da 100 cp.	5,6 gr. di cloro disponibile ogni 10 gr. di granuli. Cpr. da 4,6 gr.	<ul style="list-style-type: none"> • *** • 4 cpr ogni 10 l. di H₂O

***** Modalità di utilizzo:**
 Spargere sulla zona interessata i granuli e lasciare agire per 5 minuti
 Raccogliere tutto con carta ed eliminare nel contenitore per rifiuti speciali
 Lavare con detergente e disinfettare.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3	Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale	Pag. 108 P.T. 01/06 REV. 01
--	---	--

POLIFENOLI

SPETTRO D'AZIONE:

Attivo su virus, batteri, funghi, micobatterio tubercolare.

CARATTERISTICHE:

Liquido non infiammabile, non rientra nella classificazione di rifiuti tossico-nocivi, biodegradabile al 98% in 48 ore.

INDICAZIONI

In ambito ospedaliero *i polifenoli* sono indicati per:

- decontaminazione di strumentario chirurgico;
- disinfezione di pavimenti, pareti, arredi e attrezzature.

CONTROINDICAZIONI:

- Evitare l'uso su materiale poroso (gomma o plastica) per il rischio di assorbimento; sciacquare accuratamente gli oggetti trattati con fenoli.

MODALITA' D'USO:

Per la decontaminazione di ferri chirurgici: immergere gli strumenti, immediatamente dopo l'uso, nella soluzione di polifenoli per almeno 30', quindi procedere alle operazioni di pulizia, asciugatura e sterilizzazione. La soluzione preparata è stabile per 7 gg e qualora in uso deve essere sostituita almeno ogni 24 ore.

AVVERTENZE:

Conservare il recipiente ben chiuso.

UTILIZZO	NOME COMMERCIALE	CONFEZIONE	CONCENTRAZIONE	DILUIZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Decontaminazione ferri chirurgici 	FENPLUS HWP	<ul style="list-style-type: none"> • Buste monodose da 50 ML. • Tanica da 5 l. 	in 100 ML: 8.2 gr. di o-benzil-p-clorofenolo, p-ter-amilfenolo gr. 2.3, o-fenilfenolo gr 11.4	Allo 0,5% = 50 ML in 10 lt. di H ₂ O Allo 1% = 50 ML in 5 lt. di H ₂ O



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3	Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale	Pag. 109 P.T. 01/06 REV. 01
--	---	--

PROTEOZIM PLUS

CARATTERISTICHE:
 detergente enzimatico a rapida azione dissolvente su sangue, proteine, grassi

INDICAZIONI

- Lavaggio e detersione di strumenti ed attrezzature chirurgiche
- Lavaggio manuale di endoscopi
- Utilizzo in lavastrumenti ed in ultrasuoni

CONTROINDICAZIONI:
 Il prodotto alla diluizione d'uso non presenta controindicazioni

MODALITA' D'USO:
 Diluire 2.5 ml di prodotto in 1 lt di acqua (1 tappo ogni 3 lt di acqua). La soluzione ha solubilità immediata. Immergere gli strumenti per 10', sciacquare e procedere alla pulizia manuale.

AVVERTENZE:
 Conservare il recipiente in luogo asciutto, a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore

UTILIZZO	NOME COMMERCIALE	CONFEZIONE	CONCENTRAZIONE	DILUIZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Detersione dello strumentario chirurgico 	PROTEOZIM PLUS	<ul style="list-style-type: none"> • Tanica da 1l. 	Enzimi totali gr. 4 Tensioattivi non ionici gr. 43 Tensioattivi anionici gr. 10 antischiuma, coformulanti, sequestranti ed acqua depurata q.b.a 100 ml	2.5 ml ogni 1 lt di acqua 1 tappo ogni 3 lt di acqua

<p style="text-align: center;">SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3</p>	<p style="text-align: center;">Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale</p>	<p style="text-align: center;">Pag. 110 P.T. 01/06 REV. 01</p>
---	---	---

ALLEGATO 4

SUDDIVISIONE DELL'OSPEDALE IN AREE A DIVERSO GRADO DI RISCHIO

Tabella n. 1 Presidio OAS/OBV, aree di rischio

PADIGLIONE	ALTO RISCHIO	MEDIO RISCHIO	BASSO RISCHIO
Palazzina amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizi igienici 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Locale ristoro/sala aspetto piano terra 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Tutti i locali ed i servizi</u> dislocati nei tre piani compreso il sottopiano ▪ Portineria
De Mattia	<p><u>Tutti i locali e servizi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Divisione A ▪ Divisione C ▪ Clinica Universitaria ▪ Servizio di Pneumologia 		
Cottolengo	<p><u>Tutti i locali e servizi di:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ DH centralizzato ▪ Ambulatorio Medicina preventiva ▪ Ambulatorio Studi Clinici 		
Denis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tutti i locali e servizi <u>piano terra</u> ▪ Servizi igienici primo piano 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sorveglianza Sanitaria ▪ Ambulatorio Medicina Fisica e riabilitativa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Locali Formazione ▪ Unità operativa Handicap ▪ Scale, pianerottoli, balconi, ascensori
Casassa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizi igienici 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Psichiatria (esclusa cucina ed unità paziente) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scale, pianerottoli, balconi
Birago di Vische	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizi igienici ▪ Cappa Centralizzata preparazione Citostatici 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Medicina II° (esclusa cucina ed unità paziente) ▪ DH Oncologico (esclusa cucina ed unità paziente) ▪ Geriatria (esclusa cucina ed unità paziente) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scale, pianerottoli, ascensori
Umberto	<p><u>Tutti i locali e servizi di:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ambulatori Centralizzati 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Domiciliare ▪ Cure Palliative 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scale, pianerottoli, balconi, scivolo esterno
Centro prelievi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Tutti i locali e servizi</u> 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scale, pianerottoli
Laboratorio di Virologia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Tutti i locali e servizi</u> 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scale, pianerottoli
Laboratorio di Microbiologia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Tutti i locali e servizi</u> 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scale, pianerottoli
Laboratorio Clinica Universitaria	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Tutti i locali e servizi</u> 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scale, pianerottoli, scivolo esterno
Radiologia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizi igienici 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Tutti i locali</u> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scale, pianerottoli, scivolo esterno
Servizio Ambulanze e Accettazione Ammalati	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Tutti i locali e servizi</u> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spogliatoio personale 	
Servizio di Farmacia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizi igienici 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tutti i locali compreso il prefabbricato
Camera mortuaria	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Tutti i locali e servizi</u> 		
Altri Locali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizio di pronta assistenza per utenti Tossicodipendenti ▪ Drop IN per TD 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Locali distribuzione metadone 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Magazzino ▪ Guardaroba

<p align="center">SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3</p>	<p align="center">Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale</p>	<p align="right">Pag. 111 P.T. 01/06 REV. 01</p>
--	--	---

Tabella n. 2 Presidio OMV, aree di rischio

PADIGLIONE	ALTO RISCHIO	MEDIO RISCHIO	BASSO RISCHIO
A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizi igienici 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ U.O. Pediatria (Piano Terra) ▪ U.O. Neurologia (= 1° P) ▪ U.O. Oculistica (= 2° P) ▪ Ambulatorio Ortottica (= 1°P) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scale ▪ Pianerottoli ▪ Terrazzini ▪ Ascensori ▪ Corridoi ▪ Sotterraneo ▪ Portineria ▪ Spogliatoi personale ▪ Uffici e locali non dislocati all'interno dei reparti/servizi ▪ Sale d'attesa
B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizi igienici 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ U.O. Medicina d'Urgenza (= 2°P) ▪ D.H. Endocrinologia (= 1°P) ▪ D.H. Gastroenterologia (= 1°P) ▪ Ambulatorio Fisiopatologia della riproduzione (Piano Terra) ▪ U.O. Neuropsichiatria Infantile (Piano Terra) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scale ▪ Pianerottoli ▪ Terrazzini ▪ Ascensori ▪ Corridoi ▪ Sotterraneo ▪ Spogliatoi personale ▪ Uffici e locali non dislocati all'interno dei reparti/servizi ▪ Sale d'attesa
C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizi igienici 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ufficio Infermieristico (3°P) ▪ U.O. Prevenzione Rischio Infettivo (3°P) ▪ U.O. Medico Competente (= 2° P) ▪ U.O. Prevenzione e Protezione (= 2°P) ▪ Ufficio Assistenti Sociali (= 2°P) ▪ Ufficio Libera Professione (= 2°P) ▪ Ufficio Cartelle Cliniche (= 1°P) ▪ Aula Preparazione Parto (P.int.) ▪ Spogliatoi (P.int.) ▪ Aula Sindacale (P.int.) ▪ Scale ▪ Pianerottoli ▪ Terrazzini ▪ Ascensori ▪ Corridoi ▪ Sotterraneo ▪ Sale d'attesa
D	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unità Coronarica (Piano Terra) ▪ U.O. Emodinamica (Piano Terra) ▪ Servizi igienici 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ U.O. Ortopedia (3°P) ▪ U.O. O.R.L. (= 2°P) ▪ U.O. Cardiologia (= 1°P) ▪ Ambulatorio Cardiologia (Piano Terra) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scale ▪ Pianerottoli ▪ Terrazzini ▪ Ascensori ▪ Corridoi ▪ Sotterraneo ▪ Spogliatoi personale ▪ Uffici e locali non dislocati all'interno dei reparti/servizi ▪ Sale d'attesa
E	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizi igienici 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ U.O. Chirurgia Plastica (= 2°P) ▪ U.O. Urologia (= 2°P) ▪ U.O. Chirurgia Generale I (= 1°P) ▪ U.O. Chirurgia Generale II (= 1°P) ▪ U.O. Medicina Fisica e Riabilitazione (Piano Rialzato) ▪ Servizio ECG e prericoveri (Piano Rialzato) ▪ Logopedia (Piano Rialzato) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scale ▪ Pianerottoli ▪ Terrazzini ▪ Ascensori ▪ Corridoi ▪ Sotterraneo ▪ Spogliatoi personale ▪ Uffici e locali non dislocati all'interno dei reparti/servizi ▪ Sale d'attesa

PADIGLIONE	ALTO RISCHIO	MEDIO RISCHIO	BASSO RISCHIO
F	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Blocco Operatorio (3°P) ▪ Centrale di Sterilizzazione (3°P) ▪ Sala Operatoria di Ginecologia (= 2°P) ▪ Sale parto (= 2° P) ▪ U.O. Neonatologia (= 2°P) ▪ U.O. Anestesia e Rianimazione (= 1°P) ▪ Pronto Soccorso (Piano Terra) ▪ Servizi igienici 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ U.O. Ostetrica e Ginecologia (= 2°P) ▪ Radiologia ortopedica (= 1°P) ▪ Logopedia (= 1°P) ▪ U.O. Radiologia (Piano Terra) ▪ D.H. Oculistica (Piano Terra) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Portinerie ▪ Scale ▪ Pianerottoli ▪ Terrazzini ▪ Ascensori ▪ Corridoi ▪ Sotterranei ▪ Spogliatoi personale ▪ Uffici e locali non dislocati all'interno dei reparti/servizi ▪ Sale d'attesa ▪ Ufficio Polizia di Stato ▪ Camera Calda Pronto Soccorso
G	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizi igienici 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ambulatorio Chirurgia Plastica (Piano Terra) ▪ Servizio ambulanze (= 1°P) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scale ▪ Pianerottoli ▪ Terrazzini ▪ Ascensori ▪ Corridoi ▪ Sotterraneo ▪ Spogliatoi personale ▪ Uffici e locali non dislocati all'interno dei reparti/servizi ▪ Sale d'attesa ▪ Accettazione Amministrativa ▪ Stato Civile
H	<ul style="list-style-type: none"> ▪ U.O. Farmacia - Camera a bassa concentrazione microbica (Piano Terra) ▪ Servizi igienici 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ U.O. Provveditorato ed Economato (= 2°P) ▪ U.O. Tecnico Patrimoniale (= 1°P) ▪ U.O. Farmacia (= 1°P e Piano Terra) ▪ Portineria ▪ Centralino ▪ Scale ▪ Pianerottoli ▪ Terrazzini ▪ Ascensori ▪ Corridoi ▪ Sotterraneo
L			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cappella ▪ Locali Servizio Religioso
M	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizi igienici 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sala Gessi (= 1°P) ▪ Ambulatorio Ortopedia (= 1°P) ▪ U.O. Radiologia (Piano Terra) ▪ Odontostomatologia (Piano Terra) ▪ Palestra FKT (Piano interrato) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ U.O. Direzione Sanitaria ▪ Scale ▪ Pianerottoli ▪ Terrazzini ▪ Ascensori ▪ Corridoi ▪ Sotterraneo ▪ Spogliatoi personale ▪ Sale d'attesa
P	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ambulatorio Urologia (= 2°P) ▪ Endoscopia Digestiva (= 1°P) ▪ Sala Settoria (P.int.) ▪ Camera mortuaria (Piano interrato) ▪ Servizi igienici 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Centro trasfusionale (4°P) ▪ Laboratorio analisi (3°P) ▪ Ambulatori 2°P (escluso Ambulatorio Urologia) ▪ Ambulatori 1°P (escluso Endoscopia Digestiva) ▪ Lab. Anatomia Patologica (Piano Rialzato) ▪ Centro Prelievi (Piano Rialzato) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scale ▪ Pianerottoli ▪ Terrazzini ▪ Ascensori ▪ Corridoi ▪ Sotterraneo ▪ Uffici e locali non dislocati all'interno dei reparti/servizi

<p style="text-align: center;">SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale 3 Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Tel. 011/4393111 Codice Fiscale 03127980013 UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO UOa FARMACIA UU.OO ASL 3</p>	<p style="text-align: center;">Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale</p>	<p>Pag. 113 P.T. 01/06 REV. 01</p>
---	---	--

ALLEGATO 5

TIPOLOGIE DI RIFIUTI OSPEDALIERI (ai sensi del DPR 15/07/2003 n. 254)

<i>Categoria</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Contenitore</i>
<p>Rifiuti sanitari assimilabili agli urbani (RSAU)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Non contaminati da materiale biologico - Non provenienti da isolamenti aerei e da contatto - Non soggetti a raccolta differenziata 	<ul style="list-style-type: none"> - Sacco Nero
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rifiuti sanitari assimilabili agli urbani oggetto di raccolta differenziata 	<ul style="list-style-type: none"> - Carta, vetro, toner, cartucce, nastri, plastica - Residui di preparazione di pasti, ecc 	<ul style="list-style-type: none"> - Contenitori specifici per raccolta differenziata
<p>Rifiuti sanitari non pericolosi (RSnP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Taglienti inutilizzati - Pellicole e lastre soggette a raccolta differenziata 	<ul style="list-style-type: none"> - Contenitore a pareti rigide per aghi e taglienti - Contenitori specifici per lastre
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rifiuti sanitari non pericolosi soggetti a particolare sistema di gestione 	<ul style="list-style-type: none"> - Farmaci scaduti od inutilizzati - Sostanze stupefacenti o psicotrope (legge 309/1990) 	<ul style="list-style-type: none"> - Smaltimento a carico del servizio Farmaceutico
<p>▪ Rifiuti sanitari pericolosi (RSP)</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ A rischio infettivo (RSP-I) 	<ul style="list-style-type: none"> - Quanto proveniente da ambienti d'isolamento aereo e da contatto (anche rifiuti soggetti a raccolta differenziata, come vetro, carta, ecc.) - Quanto contaminato da sangue, liquido cerebrospinale, peritoneale, sinoviale, pleurico, amniotico - Feci ed urine in cui il clinico ravvisi una patologia trasmissibile attraverso questi 	<ul style="list-style-type: none"> - Clinical box
<ul style="list-style-type: none"> ▪ A rischio infettivo con particolari sistemi di gestione 	<ul style="list-style-type: none"> - Tessuti organici e parti anatomiche non riconoscibili 	<ul style="list-style-type: none"> - Doppio contenitore (da 20 – 40 LT) a parete rigida e sacchetto interno
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non a rischio infettivo 	<ul style="list-style-type: none"> - Liquidi di fissaggio, reflui di laboratorio, reagenti - Disinfettanti - Sostanze stupefacenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanica colorata (es. "Gialla") da 20 LT con simbolo R
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non a rischio infettivo che richiedono particolari sistemi di gestione 	<ul style="list-style-type: none"> - Citotossici, citostatici e materiali che si generano dalla loro manipolazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Contenitore a pareti rigide per aghi e taglienti - Clinical box

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

COMPILARE 4 VOLTE/AA A CURA DEL PERSONALE SANITARIO

LE DOMANDE DI SEGUITO RIPORTATE HANNO LO SCOPO DI OFFRIRE SPUNTI DI RIFLESSIONE ALL'OPERATORE CHE EFFETTUA LA DISINFEZIONE SU UN OGGETTO, SUPERFICIE AMBIENTE PERMETTENDO NEL CONTEMPO ALL'OPERATORE STESSO DI EFFETTUARE L'AUTOVALUTAZIONE DEL PROPRIO OPERATO.

QUEST'ELENCO NON HA LA PRETESA DI ESSERE ESAUSTIVO, PERCIÒ SI POSSONO AGGIUNGERE ULTERIORI DOMANDE SU CUI AUTOVALUTARSI

PRIMA DI PROCEDERE ALLA DISINFEZIONE HAI VALUTATO:

IL GRADO DI CRITICITÀ DELL'OGGETTO/AMBIENTE DA TRATTARE	_ SI	_ NO
LE CARATTERISTICHE DELL'OGGETTO/AMBIENTE DA TRATTARE	_ SI	_ NO
LE CARATTERISTICHE DELLE MOLECOLE ANTISETTICHE/DISINFETTANTI A TUA DISPOSIZIONE DA TRATTARE	_ SI	_ NO
IL TEMPO A DISPOSIZIONE	_ SI	_ NO

DURANTE LE OPERAZIONI DI DECONTAMINAZIONE/SANIFICAZIONE/DISINFEZIONE:

HAI UTILIZZATO I DPI ADEGUATI	_ SI	_ NO
HAI PREDISPOSTO LA SOLUZIONE DECONTAMINANTE/DISINFETTANTE COME DA SCHEMA SPECIFICO	_ SI	_ NO
HAI SMALTITO LA SOLUZIONE COME DA INDICAZIONI AZIENDALI	_ SI	_ NO
HAI SMALTITO I CONTENITORI VUOTI SECONDO LE INDICAZIONI AZIENDALI	_ SI	_ NO
ALTRO: _____	_ SI	_ NO

HAI INCONTRATO DIFFICOLTÀ NELL'INTRAPRENDERE LA DISINFEZIONE ; PERCHÉ': _____ _____ _____	_ SI	_ NO
--	--------	--------

NOTE: INDICA LE MOTIVAZIONI PER LE EVENTUALI SCELTE ALTERNATIVE:
