



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale 3
Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Telef. 011/4393111
Codice Fiscale 03127980013

U.O. a Prevenzione Rischio Infettivo

PROTOCOLLI DI ANTIBIOTICO-PROFILASSI

IN CHIRURGIA GENERALE

Gruppo di lavoro: U.O.a Chirurgia Generale I e II: Dott. Bronsino, Dott. Valli
U.O.a Farmacia: Dott. Mazengo
Gruppo Operativo CIO: Dott. Macor

Maggio 2003

PROFILASSI ANTIBIOTICA NELL'APPENDICECTOMIA

PATOGENI POSSIBILI: *Enterobatteri, Enterococchi, Anaerobi, Ps. aeruginosa.*

PROFILASSI CONSIGLIATA:

Prima scelta

- CEFAZOLINA 2 g. EV. + METRONIDAZOLO 500 mg. EV prima dell'intervento.
- CEFAZOLINA 1g. EV. + METRONIDAZOLO 500 mg. EV dopo 8, 16 e 24 ore

Seconda scelta

Se allergia alle beta-lattamine:

METRONIDAZOLO 500 mg E.V. + GENTAMICINA 80 mg. EV. prima dell'intervento e dopo 8, 16 e 24 ore;

proseguire con METRONIDAZOLO 500 mg per tre volte al dì, per 3-5 giorni, se l'appendice è perforata

PROFILASSI CONCORDATA

- CEFAZOLINA 2 g. EV. + METRONIDAZOLO 500 mg. EV prima dell'intervento.
- CEFAZOLINA 1g. EV. + METRONIDAZOLO 500 mg. EV dopo 8, 16 e 24 ore

COMMENTI
