



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PIEMONTE  
**Azienda Sanitaria Locale 3**  
Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Telef. 011/4393111  
Codice Fiscale 03127980013

U.O. a Prevenzione Rischio Infettivo

**PROTOCOLLI DI ANTIBIOTICO-PROFILASSI**

**IN CHIRURGIA GENERALE**

**Gruppo di lavoro:** U.O.a Chirurgia Generale I e II: Dott. Bronsino, Dott. Valli  
U.O.a Farmacia: Dott. Mazengo  
Gruppo Operativo CIO: Dott. Macor

**Maggio 2003**



U.O. a Prevenzione Rischio Infettivo

## PROFILASSI ANTIBIOTICA NELLA CHIRURGIA DEL COLON

**PATOGENI POSSIBILI:** *Enterobatteri, Enterococchi, Ps.aeruginosa, Anaerobi*

### PROFILASSI CONSIGLIATA:

#### Prima scelta

- RIFAXIMINA 200 mg, 1 cp ogni 8 ore il giorno antecedente l'intervento.
- CEFAZOLINA 2 g. EV. + METRONIDAZOLO 500 mg. EV prima dell'intervento.
- CEFAZOLINA 1g. EV. + METRONIDAZOLO 500 mg. EV dopo 8, 16 e 24 ore

#### Seconda scelta

Se allergia alle beta-lattamine:

- METRONIDAZOLO 500 mg E.V. + GENTAMICINA 80 mg. EV. prima dell'intervento e dopo 8, 16 e 24 ore;

### PROFILASSI CONCORDATA

- RIFAXIMINA 200 mg, 1 cp ogni 8 ore il giorno antecedente l'intervento.
- CEFAZOLINA 2 g. EV. + METRONIDAZOLO 500 mg. EV prima dell'intervento.
- CEFAZOLINA 1g. EV. + METRONIDAZOLO 500 mg. EV dopo 8, 16 e 24 ore

### COMMENTI

---