



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale 3
Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Telef. 011/4393111
Codice Fiscale 03127980013

U.O. a Prevenzione Rischio Infettivo

PROTOCOLLI DI ANTIBIOTICO-PROFILASSI

IN CHIRURGIA GENERALE

Gruppo di lavoro: U.O.a Chirurgia Generale I e II: Dott. Bronsino, Dott. Valli
U.O.a Farmacia: Dott. Mazengo
Gruppo Operativo CIO: Dott. Macor

Maggio 2003



U.O. a Prevenzione Rischio Infettivo

PROFILASSI ANTIBIOTICA NEI TRAUMI ADDOMINALI PENETRANTI

PATOGENI POSSIBILI: *St. aureus, Streptococchi, Clostridi*

PROFILASSI CONSIGLIATA:

Prima scelta

- CEFAZOLINA 2 g. EV. + METRONIDAZOLO 500 mg. EV prima dell'intervento
- CEFAZOLINA 1g. EV. + METRONIDAZOLO 500 mg. EV dopo 8, 16 e 24 ore

La profilassi (terapia) va proseguita e.v., per 2-5 giorni, nei pazienti con perforazione intestinale.

Seconda scelta

Se allergia alle beta-lattamine:

METRONIDAZOLO 500 mg E.V. + GENTAMICINA 80 mg. EV. prima dell'intervento e dopo 8, 16 e 24 ore;

PROFILASSI CONCORDATA

- CEFAZOLINA 2 g. EV. + METRONIDAZOLO 500 mg. EV prima dell'intervento
- CEFAZOLINA 1g. EV. + METRONIDAZOLO 500 mg. EV dopo 8, 16 e 24 ore

La profilassi (terapia) va proseguita e.v., per 2-5 giorni, nei pazienti con perforazione intestinale.

COMMENTI: