



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale 3

Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Telef. 011/4393111
Codice Fiscale 03127980013

U.O.A. PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO A.S.L. 3

**PROTOCOLLI DI ANTIBIOTICO-PROFILASSI
IN ORTOPEDIA**

**Gruppo di lavoro: Dott. Molinar Min U.O.a Ortopedia
Dott.ssa. Mazengo U.O.a Farmacia
Dott. Macor – Dott. Bonasso Gruppo Operativo P.R.I.**

Dicembre 2001

PROFILASSI ANTIBIOTICA NELL'ARTROPLASTICA E NEL POSIZIONAMENTO DI PROTESI

PATOGENI POSSIBILI: *S. aureus*, *S. epidermidis*, *Bacilli Gram -*

PROFILASSI CONSIGLIATA:

Prima scelta

CEFAZOLINA 2 gr e.v. prima dell'intervento e 6, 12 e 18 ore dopo

Seconda scelta

GENTAMICINA 80 MG. e.v. + CLINDAMICINA 600 mg. ogni 6 ore per 4 somministrazioni

PROFILASSI CONCORDATA

CEFAMANDOLO 2 gr e.v. prima dell'intervento e 6, 12 e 18 ore dopo

COMMENTI

PROFILASSI ANTIBIOTICA NEL REIMPIANTO DI PROTESI

PATOGENI POSSIBILI: *S. aureo*, *S. epidermidis*, *Enterobatteri*, *Ps.aeruginosa*

PROFILASSI CONSIGLIATA :

VANCOMICINA 1 gr. e.v in Fisiologica 500 ml, da infondere in almeno 1 ora prima dell'intervento, da ripetersi dopo 12 ore.

PROFILASSI CONCORDATA :

VANCOMICINA 1 gr. e.v in Fisiologica 500 ml, da infondere in almeno 1 ora prima dell'intervento, da ripetersi dopo 12 ore.

**PROFILASSI ANTIBIOTICA IN CORSO DI INTERVENTI DI
CHIRURGIA ARTROSCOPICA, DELLA MANO E DEL PIEDE,
DELLA SPALLA, DI ERNIA DISCALE
(CHIRURGIA ELETTIVA PULITA)**

PATOGENI POSSIBILI: *S.epidermidis, S. aureus.*

PROFILASSI CONSIGLIATA:

TRATTANDOSI DI CHIRURGIA PULITA, LA PROFILASSI NON DOVREBBE ESSERE INDICATA. PUR NON ESSENDOSI DATI SUFFICIENTI, POTREBBE ESSERE CONSIGLIATA NELLA CHIRURGIA DELLA SPALLA E NELL'ERNIA DISCALE E NON NECESSARIA NELLA CHIRURGIA ARTROSCOPICA ED IN QUELLA ELETTIVA DELLA MANO E DEL PIEDE. OPPURE ESSERE PROPOSTA SOLO NEI PAZIENTI AD ALTO RISCHIO, INDIPENDENTEMENTE DAL R.I.
NEL CASO SI OPTI PER ESEGUIRE LA PROFILASSI, LA PRIMA SCELTA PUO' ESSERE RAPPRESENTATA DA

CEFAZOLINA 2 gr. e.v. prima dell'intervento in monodose (extra short-term)

SECONDA SCELTA

GENTAMICINA 120 mg. e.v. + CLINDAMICINA 600 mg. e.v., negli allergici ai β -lattamici

PROFILASSI CONCORDATA:

CEFAMANDOLO 2 gr.e.v. prima dell'intervento