



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PIEMONTE  
**Azienda Sanitaria Locale 3**

Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Telef. 011/4393111  
Codice Fiscale 03127980013

**U.O.A. PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO A.S.L. 3**

---

**PROTOCOLLI DI ANTIBIOTICO-PROFILASSI  
IN CHIRURGIA O.R.L.**

**Gruppo di lavoro: Dott. Vergano U.O.a O.R.L.  
Dott. Macor – Gruppo Operativo P.R.I.**

SETTEMBRE 2002

# **I - PROFILASSI ANTIBIOTICA NELLA CHIRURGIA O.R.L.: INTERVENTI DI CHIRURGIA PULITA E PULITA – CONTAMINATA (tiroidectomia, ghiandole salivari, cisti, settoplastica, rinoplastica, seni paranasali, polipectomia transnasale, cordectomia, tracheotomia, exeresi neoformazioni orofaringee o cavo orale senza svuotamento lfn...)**

PATOGENI POSSIBILI: *Streptococchi, S. aureus, Anaerobi, Enterobatteri Gram -*

## **PROFILASSI CONSIGLIATA:**

Prima scelta

CEFAZOLINA 2 gr. e.v. prima dell'intervento e 8 e 16 ore dopo

Seconda scelta

AMOXICILLINA + AC. CLAVULANICO 2,2 g. ev. prima dell'intervento e 12 ore dopo

**Negli allergici ai betalattamici:** GENTAMICINA 80 mg. ev. +  
CLINDAMICINA 300 mg. ev. prima dell'intervento e 8 e 16 ore dopo,  
oppure CLARITROMICINA 500 mg. x os. Preoperatori e 12 ore dopo

## **PROFILASSI CONCORDATA**

**AMOXICILLINA + AC. CLAVULANICO 2,2 g. ev. prima  
dell'intervento e 12 ore dopo**

## **COMMENTI**

- Non indicata profilassi nella chirurgia endoscopica faringo – laringea e nelle adenotonsillectomie.
- Negli interventi con posizionamento di tampone nasale la profilassi viene proseguita sino alla loro rimozione, con Amox. / Clavul. cpr. 1 g. ogni 8 ore.
- Negli interventi di setto e rinoseptoplastica la profilassi viene eseguita per via orale.
- Negli interventi sui seni paranasali proseguire terapia con fluorochinoloni per os x 5 giorni in presenza di fenomeni infiammatori

## **II - PROFILASSI ANTIBIOTICA NELLA CHIRURGIA O.R.L.: INTERVENTI DI CHIRURGIA ONCOLOGICA MAGGIORE (pulita–contaminata o contaminata)**

PATOGENI POSSIBILI: *Streptococchi, S. aureus, Anaerobi, Enterobatteri Gram -*

### **PROFILASSI CONSIGLIATA:**

#### Prima scelta

GENTAMICINA 80 mg. ev. + CLINDAMICINA 300 mg. ev. prima dell'intervento e 8 e 16 ore dopo

#### Seconda scelta

CEFAZOLINA 2 g. ev. prima dell'intervento e 8 e 16 ore dopo

CEFTIZOXIME o CEFTAZIDIME 2g. ev. prima dell'intervento 12 ore dopo

### **PROFILASSI CONCORDATA**

CEFTAZIDIME 1g. ev. ogni 12 ore per 5 giorni

### **COMMENTI**

Il Protocollo esprime un intento più terapeutico che profilattico