



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale 3

Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Telef. 011/4393111
Codice Fiscale 03127980013

U.O. a Prevenzione Rischio Infettivo

**PROTOCOLLI DI ANTIBIOTICO-PROFILASSI
IN CHIRURGIA PLASTICA**

**Gruppo di lavoro: U.O.a Chirurgia Plastica
U.O.a Farmacia
Gruppo Operativo CIO**

Maggio 2003

I. PROFILASSI ANTIBIOTICA IN CHIRURGIA PLASTICA

- **CHIRURGIA PULITA SENZA POSIZIONAMENTO PROTESI** (asportazione neoformazioni o piccole masse, piccoli lembi, innesti, etc..)

PATOGENI POSSIBILI: *St. aureo, St. epidermidis, Streptococchi*

NON INDICATA PROFILASSI ANTIBIOTICA

- **CHIRURGIA PULITA SENZA POSIZIONAMENTO PROTESI** (Morbo di Dupuytren, Tunnel carpale, cisti polso, alluce valgo, correzione cicatrici, ernie ombelicali, ricostruzione NAC, ricostruzioni tendinee, fimosi, ginecomastia, liposuzioni, linfonodo sentinella, svuotamento linfonodale etc..)

PATOGENI POSSIBILI: *St. aureo, St. epidermidis, Streptococchi*

PROFILASSI CONSIGLIATA:

Prima scelta

CEFAZOLINA 2 gr e.v. prima dell'intervento

Seconda scelta (se allergia alle beta- lattamine)

GENTAMICINA 120 mg e.v. e CLINDAMICINA 600 mg e.v.,

PROFILASSI CONCORDATA

CEFAZOLINA 2 gr e.v. prima dell'intervento

II. PROFILASSI ANTIBIOTICA IN CHIRURGIA PLASTICA

- **CHIRURGIA PULITA CON POSIZIONAMENTO PROTESI** (mastoplastica riduttiva, ricostruzione mammaria con protesi espansoria, lembi fasciocutanei, etc..)

PATOGENI POSSIBILI: *St. aureo, St. epidermidis, Streptococchi*

PROFILASSI CONSIGLIATA:

Prima scelta

CEFAZOLINA 2 gr e.v. prima dell'intervento e dopo 8 e 16 ore

Seconda scelta (se allergia alle beta- lattamine)

GENTAMICINA 120 mg e.v. e CLINDAMICINA 600 mg e.v.

PROFILASSI CONCORDATA

CEFAZOLINA 2 gr e.v. prima dell'intervento e dopo 8 e 16 ore

III. PROFILASSI ANTIBIOTICA IN CHIRURGIA PLASTICA

- **CHIRURGIA PULITA –CONTAMINATA** (addominoplastica, amputazioni, traumi osteoarticolari, etc..)

PATOGENI POSSIBILI: *St. aureo, St. epidermidis, Streptococchi, Ps. Aeruginosa. Enterobatteri Anaerobi*

PROFILASSI CONSIGLIATA:

Prima scelta

CEFAZOLINA 2 gr e.v. prima dell'intervento e dopo 8 e 16 ore

Seconda scelta (se allergia alle beta- lattamine)

GENTAMICINA 120 mg e.v. e CLINDAMICINA 600 mg e.v.

PROFILASSI CONCORDATA

CEFAZOLINA 2 gr e.v. prima dell'intervento e dopo 8 e 16 ore

IV. PROFILASSI ANTIBIOTICA IN CHIRURGIA PLASTICA

- **CHIRURGIA TESTA/COLLO O MANOVRE CON UTILIZZO DI LEMBI MICROCHIRURGICI**
(demolizione/ricostruzioni laringo-faringee, etc..)

PATOGENI POSSIBILI: *St. aureo, St. epidermidis, Streptococchi, Ps. Aeruginosa. Enterobatteri Gram -, Anaerobi*

QUESTI INTERVENTI, PER COMPLESSITA' E DELICATEZZA, ANCHE SE COMPIUTI IN ELEZIONE, VANNO CONSIDERATI COME INTERVENTI DI CHIRURGIA CONTAMINATA E PERTANTO SOTTOPOSTI A TERAPIA E NON A SEMPLICE PROFILASSI ANTIBIOTICA