

MISURE PRECAUZIONALI PER GLI OPERATORI SANITARI DA ADOTTARE NELLA MANIPOLAZIONE DI STRUMENTI ACUMINATI E/O TAGLIENTI

OBIETTIVO:

Prevenzione degli incidenti occupazionali causati da aghi, bisturi ed altri dispositivi taglienti

RISORSE MATERIALI:

- Guanti monouso.
- Contenitore rigido per l'eliminazione di acuminati e taglienti, in plastica resistente e a chiusura ermetica definitiva.
- Pinza per la raccolta degli aghi.

OPERATORI INTERESSATI:

Tutti gli operatori sanitari che manipolano aghi, bisturi ed altri dispositivi taglienti

PROCEDURE E RACCOMANDAZIONI:

Ogni volta che si manipolano strumenti acuminati e/o taglienti bisogna:

- **porre la massima attenzione** durante ogni operazione che comporti l'uso di tali strumenti, con particolare riguardo agli interventi svolti in regime d'urgenza;
- **non indirizzare** mai la punta di aghi e bisturi verso parti del corpo;
- cercare di **non passare** i taglienti di mano in mano; se la manovra è necessaria, lo strumento deve essere passato con la dovuta cautela.
- **Non raccogliere** strumenti appuntiti o taglienti se stanno cadendo.
- **Non raccogliere** gli aghi caduti a terra con le mani: utilizzare apposite pinze.
- **Non portare** in tasca aghi, bisturi ed ogni altra sorta di dispositivo tagliente.
- **Indossare guanti monouso** prima di manipolare strumenti acuminati e/o taglienti.

Ogni volta che si devono smaltire strumenti acuminati e/o taglienti bisogna:

- **riporre immediatamente dopo l'utilizzo** aghi, bisturi ed ogni sorta di tagliente nell'apposito contenitore in plastica resistente; tale contenitore:
 - ❖ deve essere assemblato correttamente prima della messa in uso: la parte superiore con la fenestrazione per aghi deve essere fissata alla parte inferiore (secchiello) effettuando una pressione tale da impedire la disconnessione delle due parti durante la messa in uso.
 - ❖ deve trovarsi nelle immediate vicinanze rispetto alla zona dove vengono utilizzati acuminati e taglienti;
 - ❖ deve essere riempito NON oltre i 2/3 della sua capacità; una volta riempito deve essere chiuso ermeticamente e smaltito nel contenitore per rifiuti sanitari (clinical- box);
 - ❖ **non deve MAI essere travasato** il contenuto da un contenitore ad un altro, anche se presente in minima quantità,.
- **non disconnettere manualmente** gli aghi dalle siringhe; la siringa deve essere eliminata con l'ago connesso direttamente nel contenitore in plastica rigida.
- **Non rincappucciare** gli aghi dopo l'uso.
- **Non piegare o rompere** lame, aghi ed ogni sorta di altro dispositivo tagliente.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:

1. Ministero della Sanità - D.M. 28 settembre 1990 - Norme di protezione dal contagio professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private.
2. Centers for Disease Control - Guideline for Isolation Precautions in Hospitals - Atlanta, USA, 1996.
3. S. D. Schaffer et al. - Prevenzione delle infezioni e sicurezza nelle procedure - Edizione italiana a cura di G. Ippolito e N. Petrosillo - Il Pensiero Scientifico Editore - Maggio 1997.