



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale 3
Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Telef. 011/4393111
Codice Fiscale 03127980013

U.O. a Prevenzione Rischio Infettivo

PROTOCOLLI DI ANTIBIOTICO-PROFILASSI

IN UROLOGIA

Gruppo di lavoro: U.O.a Chirurgia UROLOGICA: Dott. Moroni
U.O.a Farmacia: Dott. Mazengo
Gruppo Operativo CIO: Dott. Macor

FEBBRAIO 2002

I - PROFILASSI ANTIBIOTICA IN UROLOGIA

INTERVENTI PULITI (VARICOCELE, IDOCELE, FIMOSI,...)

PATOGENI POSSIBILI: *St. aureus*, *St. epidermidis*

PROFILASSI ATTUALE:

Prima scelta

CEFAZOLINA 1g. e.v. prima dell'intervento

Seconda scelta

AMOXICILLINA + AC. CLAVULANICO 2g. per os prima dell'intervento

Se allergia alle β - lattamine: GENTAMICINA 80 mg. e.v. prima dell'intervento

PROFILASSI CONCORDATA

CEFAZOLINA 2 g. prima dell'intervento

II - PROFILASSI ANTIBIOTICA IN UROLOGIA

INTERVENTI PULITI – CONTAMINATI (RESEZIONI ENDOSCOPICHE, ADENOMECTOMIE ENDOSCOPICHE O LAPAROTOMICHE, PROSTATECTOMIE, NEFRECTOMIE, CALCOLOSI NON COMPLICATE, CISTECTOMIE,...)

PATOGENI POSSIBILI: *Enterobatteri, Enterococco, Ps. Aeruginosa, St. aureus*

PROFILASSI ATTUALE:

Prima scelta

CEFAZOLINA 1g. e.v. prima dell'intervento e dopo 8 ore, seguita da FLUOROCHINOLONICI per os ogni 12 ore fino a rimozione del catetere vescicale

Seconda scelta

Se allergia alle β - lattamine, GENTAMICINA 80 mg. e.v. prima dell'intervento e dopo 8 ore, seguita da FLUOROCHINOLONICI per os ogni 12 ore fino a rimozione del catetere vescicale

PROFILASSI CONCORDATA

CEFAZOLINA 2 g. prima dell'intervento e dopo 8 ore, seguita da FLUOROCHINOLONICI per os ogni 12 ore fino a rimozione del catetere vescicale

III - PROFILASSI ANTIBIOTICA IN UROLOGIA

INTERVENTI CON UTILIZZO DI SEGMENTI INTESTINALI (APERTURA DEL PERITONEO)

PATOGENI POSSIBILI: *Enterobatteri, Enterococco, Ps. Aeruginosa, Anaerobi*

PROFILASSI CONSIGLIATA:

Prima scelta

NEOMICINA + BACITRACINA per os 1 cp. Ogni 8 ore il giorno precedente + CEFAZOLINA 2 g. e.v. prima dell'intervento e ogni 8 ore per le 48 ore successive

Seconda scelta

Se allergia alle β - lattamine, METRONIDAZOLO 500 mg. e.v. e GENTAMICINA 80 mg. e.v. prima dell'intervento e ogni 8 ore per le 48 ore successive

PROFILASSI CONCORDATA

NEOMICINA + BACITRACINA per os 1 cp. Ogni 8 ore il giorno precedente + CEFAZOLINA 2 g. e.v. prima dell'intervento e ogni 8 ore per le 48 ore successive